

**Власник(и):****Підтримувач(і):**

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотила паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість сильна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глясுவатість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середньої товщини. Час досягання середній.

Товарний урожай 12,6 т/га, середня маса плоду 140 г; дегустаційна оцінка 9 балів; вихід стиглих товарних плодів 95,0 %; днів до досягання - 70; дружність досягання 9,0 балів; суха речовина 6,8%; загальний цукор 2,5%; вітамін С 120 мг/%; клітковина 0,9%.

**05037036 Цинтія F1****Заявник:** Приватне мале підприємство "Тирас"**Власник(и):****Підтримувач(і):**

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотила паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду горизонтальне. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, сильна глясுவатість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середньої товщини. Час досягання пізній.

Товарний урожай 12,0 т/га, середня маса плоду 140 г; дегустаційна оцінка 9,0 балів; вихід стиглих товарних плодів 98,0 %; днів до досягання - 135; дружність досягання 8,0 балів; суха речовина 7,0%; загальний цукор 3,0%; вітамін С 165 мг/%; клітковина 0,9%.

**Петрушка****06163004 Акелла****Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**Власник(и):****Підтримувач(і):**

Рослина середня за висотою. Листки рідкі. Кучерявість листкової пластинки відсутня. Рослина напівпряма за положенням. Листок трикутний за формою. Черешок листка тонкий.

Товарний урожай - 350-400 ц/га; середня маса коренеплоду - 120-145 г; дегустаційна оцінка - 4,7-4,8 бала; днів до досягання 90-100; борошниста роса - 2-2,5%; гниль біла - 0,5-1,2%.

**06163005 Капрічіо****Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"**Власник(и):****Підтримувач(і):**

Рослина низька. Листки дуже щільні. Наявна сильна кучерявість листкової пластинки. Рослина напівпряма за положенням. Листок трикутний за розміром. Черешок листка тонкий.

Товарний урожай 300-350 ц/га; урожай ранньої продукції 70-80 ц/га; дегустаційна оцінка 4,7-4,8 балів; днів до досягання 95-100; борошниста роса 2-

2,5%; гниль біла 0,5-1,2%.

## Помідор

### **06040001 /Одеська перлина/**

**Заявник:** Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) середнього розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність - 46-52 т/га; товарна урожайність - 45-50 т/га; урожайність ранньої продукції - 20-25 т/га; маса товарного плоду - 80-95 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 89-95 днів; період плодоношення - 50-68 днів; дружність визрівання - 50-55%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: попелицею 2-3; вміст сухої речовини в плоді - 6,8%; вміст загального цукру - 3,416 %; вміст вітаміну С - 38,7 мг%; дегустаційна оцінка свіжих плодів - 4,8 балів, у переробці - 4,6 бала; транспортабельність - 4 бала.

### **05040100 Арія**

**Заявник:** Шевченко Ігор Андрійович

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість і глянуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) маленького розміру. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 170-190 г; період від повних сходів до початку дозрівання 90 днів; період плодоношення 48 днів; вміст сухої речовини в плоді 7,5 %; вміст загального цукру 4,2 %; вміст вітаміну С 17,1 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

### **05040046 Баловень**

**Заявник:** Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, широкий, середній за довжиною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) великого розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 62,4 т/га; товарна урожайність 50,1 т/га; урожайність ранньої продукції 21,8 т/га; маса товарного плоду 82 г; період від повних сходів до початку дозрівання 94 дні; період плодоношення 31 день; дружність визрівання 35%; ураженість хворобами та