

пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 7, макроспоріозом 3; вміст сухої речовини в плоді 5,2%; вміст загального цукру 2,9%; вміст вітаміну С 18,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,8; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,6; транспортабельність 4,0 бала.

07040005 Беніто F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип розвитку. Листок у середній третині рослини похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість слабкі. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром еліптичної форми. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) маленьке, світло-зеленого кольору. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та досягання ранній.

Вміст каротину, мг% - 2,3; Вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; Вміст вітаміну С, мг% - 22,3; Вміст загального цукру - 5,3%; Загальна урожайність 20 кг/м²; Маса товарного плоду - 100-140 г; Період від повних сходів до початку дозрівання 70 днів; Період плодоношення 20 днів; Пошкодження шкідниками: попелицею 7%; Ураженість хворобами: вірусними хворобами 7%, гнилями 7%, макроспоріозом 8%, фітофторозом 9%.

05040079 Бобкат F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість і глянуватість помірні. Квітка жовта. Плід дуже великий за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння середній.

Група стиглості - пізньостиглий; загальна урожайність 100 т/га; товарна урожайність 80 т/га; урожайність ранньої продукції 70 т/га; маса товарного плоду 220 г; період від повних сходів до початку дозрівання 80 днів; період плодоношення 35 днів; дружність визрівання 60 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 5, макроспоріозом 5, гнилями 5, вірусними хворобами 5; вміст сухої речовини в плоді 6 %; вміст загального цукру 9 %; вміст вітаміну С 4 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 7; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 8; транспортабельність 7 балів.

04040026 Бармалей F1

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, перистий, пухирчастість помірні, глянуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід середній за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; загальна урожайність 16,5 кг/м²; товарна урожайність 16 кг/м²; урожайність ранньої продукції 3,8 кг/м²; маса товарного плоду 145 г; період від повних сходів до початку дозрівання 98 днів; період плодоношення 85 днів; дружність визрівання 75 %; ураженість