

пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 7, макроспоріозом 3; вміст сухої речовини в плоді 5,2%; вміст загального цукру 2,9%; вміст вітаміну С 18,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,8; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,6; транспортабельність 4,0 бала.

07040005 Беніто F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Детермінантний тип розвитку. Листок у середній третині рослини похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість слабкі. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром еліптичної форми. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабе. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) маленьке, світло-зеленого кольору. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та досягання ранній.

Вміст каротину, мг% - 2,3; Вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; Вміст вітаміну С, мг% - 22,3; Вміст загального цукру - 5,3%; Загальна урожайність 20 кг/м²; Маса товарного плоду - 100-140 г; Період від повних сходів до початку дозрівання 70 днів; Період плодоношення 20 днів; Пошкодження шкідниками: попелицею 7%; Ураженість хворобами: вірусними хворобами 7%, гнилями 7%, макроспоріозом 8%, фітофторозом 9%.

05040079 Бобкат F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість і глянуватість помірні. Квітка жовта. Плід дуже великий за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння середній.

Група стиглості - пізньостиглий; загальна урожайність 100 т/га; товарна урожайність 80 т/га; урожайність ранньої продукції 70 т/га; маса товарного плоду 220 г; період від повних сходів до початку дозрівання 80 днів; період плодоношення 35 днів; дружність визрівання 60 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 5, макроспоріозом 5, гнилями 5, вірусними хворобами 5; вміст сухої речовини в плоді 6 %; вміст загального цукру 9 %; вміст вітаміну С 4 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 7; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 8; транспортабельність 7 балів.

04040026 Бармалей F1

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, перистий, пухирчастість помірні, глянуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід середній за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; загальна урожайність 16,5 кг/м²; товарна урожайність 16 кг/м²; урожайність ранньої продукції 3,8 кг/м²; маса товарного плоду 145 г; період від повних сходів до початку дозрівання 98 днів; період плодоношення 85 днів; дружність визрівання 75 %; ураженість

хворобами та пошкодження шкідниками, %: макроспоріозом 10; вміст сухої речовини в плоді 5,5 %; вміст загального цукру 2,8 %; вміст вітаміну С 24 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5, у переробці 5; транспортабельність 4,8 бала.

05040098 Батлер КС

Заявник: Шевченко Ігор Андрійович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за розміром, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянуватість слабка. Квітка жовта. Плід великий за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) середнього розміру. Плід середній за твердістю, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання 97 днів; період плодоношення 61 день; вміст сухої речовини в плоді 7 %; вміст загального цукру 5,3 %; вміст вітаміну С 16,1 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

06040004 Баджіо

Заявник: Агро-Тіп

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий і широкий, перистий, пухирчастість та глянуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та досягання ранні.

Загальна урожайність 120-130 т/га; товарна урожайність 80-90 т/га; маса товарного плоду 75-80 г; період від повних сходів до початку дозрівання 85 днів; період плодоношення 24 дні; дружність визрівання 99%; вміст сухої речовини в плоді 7%; вміст загального цукру 5,5-6%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 3; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 5; транспортабельність 9 балів.

05040015 Більшовик F1

Заявник: Динник Анатолій Васильович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром серцевидної форми у поздовжньому розрізі. Розмір рубчику плодоніжки великий. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід м'який, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння помірний.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 59,8 т/га; товарна урожайність 57,3 т/га; урожайність ранньої продукції 45,4 т/га; маса товарного плоду 100-110 г; період від повних сходів до початку дозрівання 105-110 днів; період плодоношення 32-35 днів; дружність визрівання 88,4%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 2,9, макроспоріозом 1,1, гнилями 0,9, попелицею 0,8; вміст сухої речовини в плоді 5,7%; вміст загального цукру 2,1-3,9%; вміст вітаміну С 19,0 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 3,9; дегустаційна оцінка, балів: у