

переробці 4,3; транспортабельність 4,6 балів.

### 05040040 Великий Канйон

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глясுவатість слабкі. Квітка жовта. Плід маленький за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння помірний.

Група стиглості - середньостиглий; загальна урожайність 85-90 т/га; товарна урожайність 83-87 т/га; урожайність ранньої продукції 25-34 т/га; маса товарного плоду 92-105 г; період від повних сходів до початку дозрівання 115-120 днів; період плодоношення 45-50 днів; дружність визрівання 70-72%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 2,5-3, макроспоріозом 0,21-0,27, гнилями 0,2-0,3, вірусними хворобами 0,3-0,5; вміст сухої речовини в плоді 8,3-8,5%; вміст загального цукру 7,1-7,3%; вміст вітаміну С 75-80 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,6-4,7; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,8-4,9; транспортабельність 4,8-4,9 балів.

### 05040072 ГС 12 F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий і широкий, двічі перистий, пухирчастість і глясுவатість помірні. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед досяганням) середнього розміру. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий. Час цвітіння середній.

Група стиглості - середньоранній; загальна урожайність 95 т/га; товарна урожайність 75 т/га; урожайність ранньої продукції 40 т/га; маса товарного плоду 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання 60 днів; період плодоношення 35 днів; дружність визрівання 65 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 5, макроспоріозом 7; вміст сухої речовини в плоді 6 %; вміст загального цукру 9 %; вміст вітаміну С 2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5; транспортабельність 5 балів.

### 05040041 Глобемастер F1

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, перистий, пухирчастість помірна, глясுவатість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескатої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - не круглої. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед досяганням) маленького розміру. Плід м'який, рожевого кольору. М'якоть рожева. Час цвітіння помірний.

Група стиглості - середньостиглий; загальна урожайність 110-115 т/га; товарна урожайність 105-110 т/га; урожайність ранньої продукції 50-55 т/га; маса товарного плоду 430-750 г; період від повних сходів до початку дозрівання 117-125 днів; період плодоношення 50-60 днів; дружність визрівання

30-35%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 2,8-3,5, макроспоріозом 0,1-0,2, гнилями 0,1-0,15, вірусними хворобами 0,3-0,4; вміст сухої речовини в плоді 8,2-8,4%; вміст загального цукру 7,6-7,8%; вміст вітаміну С 70-72 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,8-5,0; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,6-4,7; транспортабельність 4,7-4,8 бала.

### **05040044 Дама**

**Заявник:** Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за розміром, перистий, пухирчастість сильна, глянуватість помірна. Квітка жовта. Плід середній за розміром, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - пізній; загальна урожайність 48,5 т/га; товарна урожайність 44,6 т/га; урожайність ранньої продукції 6,8 т/га; маса товарного плоду 78 г; період від повних сходів до початку дозрівання 110 днів; період плодоношення 49 днів; дружність визрівання 13%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 0,0, макроспоріозом 9,0; вміст сухої речовини в плоді 5,6%; вміст загального цукру 3,4%; вміст вітаміну С 23,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,4; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,8; транспортабельність 5,0 балів.

### **05040045 Елеонора**

**Заявник:** Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість та глянуватість слабкі. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - не круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід середній за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - середньоранній; загальна урожайність 58,2 т/га; товарна урожайність 50,1 т/га; урожайність ранньої продукції 19,8 т/га; маса товарного плоду 76 г; період від повних сходів до початку дозрівання 104 днів; період плодоношення 41 день; дружність визрівання 34%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 9, макроспоріозом 7, гнилями 3; вміст сухої речовини в плоді 5,4%; вміст загального цукру 3,2%; вміст вітаміну С 24,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,8; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,8; транспортабельність 4,8 бала.

### **07040004 Експрес F1**

**Заявник:** Бейо Заден Б.В.

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Детермінантний тип розвитку. Листок у середній третині рослини похилий, середнього розміру, перистий, пухирчастість та глянуватість слабкі. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром округлої форми. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) середнього розміру Плід м'який, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та досягання ранній.