

Вміст каротину, мг% - 2,1; Вміст сухої речовини в плоді - 6,2%; Вміст вітаміну С, мг% - 22; Вміст загального цукру - 5,3%; Загальна урожайність 12 кг/м²; Маса товарного плоду - 120-130 г; Період від повних сходів до початку дозрівання 54 дні; Період плодоношення 20 днів; Пошкодження шкідниками: попелицею 7%; Ураженість хворобами: вірусними хворобами 7%, гнилями 7%, макроспоріозом 8%, фітофторозом 9%.

05040048 Зореслав

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість та глянуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) маленького розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та досягання помірний.

Загальна урожайність 52-61,8 т/га; товарна урожайність 51,7-61,2 т/га; урожайність ранньої продукції 14,5 т/га; маса товарного плоду 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання 105-115 днів; дружність визрівання 72%; вміст сухої речовини в плоді 5,5%; вміст загального цукру 3,08%; вміст вітаміну С 31,95 мг%.

05040080 Колядник

Заявник: Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий і широкий, перистий, пухирчастість і глянуватість слабкі. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння середній.

Група стиглості - пізностиглий; загальна урожайність 63,4 т/га; товарна урожайність 34 т/га; маса товарного плоду 90 г; період від повних сходів до початку дозрівання 120 днів; дружність визрівання 46 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: макроспоріозом 3,9, гнилями 4,2, вірусними хворобами 6,7; вміст сухої речовини в плоді 6 %; вміст загального цукру 3,4 %; вміст вітаміну С 20,8 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4; транспортабельність висока.

05040097 Конорі

Заявник: Шевченко Ігор Андрійович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, перистий, пухирчастість і глянуватість слабкі. Квітка жовта. Плід маленький за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) середнього розміру. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий. Час цвітіння середній.

Група стиглості - ранностиглий; загальна урожайність 35 т/га; товарна урожайність 32 т/га; урожайність ранньої продукції 25 т/га; маса товарного