

**Цибуля батун****06174002 Рапіра**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Однопсевдостебловий тип росту. Рослина висока. Положення листка пряме, наявний сильний восковий наліт. Псевдостебло довге, антоціанове забарвлення відсутнє. Схильність до стрілкування у рослини слабка.

Загальна урожайність 30-35 т/га; товарна урожайність 27-32 т/га; вегетаційний період 115-120 днів; лежкість 75 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: несправжньою борошнистою россою 2-2,2, гнилями 0,2-0,3, цибулевою мухою 0,1-0,15; вміст сухої речовини в плоді 6,6-6,9%; вміст загального цукру 5,1-5,3 %; вміст вітаміну С 8-8,5 мг%; транспортальність 4,7-4,9 бала.

**Цибуля городня****05041020 Саброссо F1**

Заявник: Нюнемс Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт дуже сильний. Листок довгий. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка тонка, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 90,0 т/га, маса товарної цибулини 200 г, вегетаційний період 125 днів. Лежкість - 98%. Вміст вітаміну С, мг% - 10,0. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,0. Вміст загального цукру, % - 9,0.

**07041006 Сібір (BGS 204)**

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, помірний восковий наліт. Листок середній за довжиною, великий - за діаметром. Цибулина мала за розміром, округлої форми, злегка опукла, сильна міцність тримання сухої шкірки після збирання. Суха шкірка середня за товщиною, жовтого кольору. Соковиті луски зеленуватого забарвлення. Дуже мало зачатків. Початок збиральної стиглості за сівби восени і весняного висіву - ранні. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м<sup>2</sup>, вегетаційний період 110 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 7,2. Вміст сухої речовини в плоді, % - 18. Вміст загального цукру, % - 12. Пошкодження шкідниками, %: цибулевою мухою - 1. Ураженість хворобами, %: гнилями - 3

**07041005 Дербі F1**

Заявник: Бейо Заден Б.В.