

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, слабкий восковий наліт. Листок довгий. Цибулина середня за розміром, низька, округлої форми, злегка опукла, слабка міцність тримання сухої шкірки після збирання. Суха шкірка тонка, коричневого кольору. Соковиті луски зеленуватого забарвлення. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна урожайність - 6,0 кг/м², вегетаційний період 93 дні. Вміст вітаміну С, мг% - 7,1. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,5. Вміст загального цукру, % - 11,5. Пошкодження шкідниками, %: цибулевою мухою - 1. Ураженість хворобами, %: гнилями - 3

04041001 Краса F1

Заявник: Приватне мале підприємство "Тирас"

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, помірний восковий наліт. Листок короткий. Цибулина середня за розміром, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка тонка, жовтого кольору. Соковиті луски зеленуватого забарвлення. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність - 35,0 т/га, вегетаційний період 105 дні. Вміст вітаміну С, мг% - 10,6. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,5. Вміст загального цукру, % - 7,5.

07041008 Леоне

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, помірний восковий наліт. Листок довгий, середній - за діаметром. Цибулина середня за розміром, широкояцевидної форми, злегка опукла, сильна міцність тримання сухої шкірки після збирання. Суха шкірка середня за товщиною, коричневого кольору. Соковиті луски зеленуватого забарвлення. Мала кількість зачатків. Початок збиральної стиглості за сівби восени і весняного висіву - середні. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна урожайність - 3,0 кг/м², вегетаційний період 150 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 7,8. Вміст сухої речовини в плоді, % - 20. Вміст загального цукру, % - 10. Пошкодження шкідниками, %: цибулевою мухою - 1. Ураженість хворобами, %: гнилями - 3

05041022 Моноліт 4

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт помірний. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, поперечноеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання слабка. Суха шкірка тонка, жовтого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.