

Загальна врожайність – 60,0 т/га, маса товарної цибулини 130 г, вегетаційний період 120 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 7,0. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,3. Вміст загального цукру, % - 8,3.

05041023 Позолочений Глобус

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт помірний. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання сильна. Суха шкірка товста, жовтого кольору. Забарвлення соковитих зеленувате. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 85,0 т/га, маса товарної цибулини 95-150 г, вегетаційний період 130 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 9,5. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,5. Вміст загального цукру, % - 8,4.

06041004 Робот (Райнсбургер 5)

Заявник: Нікерсон- Цваан Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, восковий наліт сильний. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, поперечновузькоеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання слабка. Суха шкірка середньої товщини, білого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Середня кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 60,0 т/га, маса товарної цибулини 150 г, вегетаційний період 135 днів. Лежкість - 98%. Вміст вітаміну С, мг% - 9,5. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,0. Вміст загального цукру, % - 8,2.

07041007 Ред Булл F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя від прямого до напівпрямого, помірний восковий наліт. Листок довгий, великий - за діаметром. Цибулина велика за розміром, плескатої форми, помірна міцність тримання сухої шкірки після збирання. Суха шкірка середня за товщиною, червоного кольору. Соковиті луски червонуватого забарвлення. Дуже мало зачатків. Початок збиральної стиглості за сівби восени і весняного висіву - ранні. Початок проростання цибулини протягом зберігання середній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна урожайність - 5,0 кг/м², вегетаційний період 120 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 7,2. Вміст сухої речовини в плоді, % - 18. Вміст загального цукру, % - 12. Пошкодження шкідниками, %: цибулевою мухою - 1. Ураженість хворобами, %: гнилями - 3

05041024 Серпнева

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):