

Підтримувач(i):

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, восковий наліт відсутній. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання слабка. Суха шкірка тонка, білого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 90,0 т/га, маса товарної цибулини 115-250 г, вегетаційний період 130 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 7,5. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,4. Вміст загального цукру, % - 8,2.

05041009 Форум

Заявник:

Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и):

Підтримувач(i):

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, помірний восковий наліт. Листок середньої довжини. Цибулина середня за розміром, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка тонка, золотистого кольору. Соковиті луски зеленуватого забарвлення. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 80,0 т/га, маса товарної цибулини 85-135 г, вегетаційний період 120 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 11,2. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,5. Вміст загального цукру, % - 7,5.

05041025 Червоний Глобус

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(i):

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, восковий наліт відсутній. Листок середньої довжини. Цибулина великого розміру, висока, широкооберненояйцевидної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середньої товщини, червоного кольору. Забарвлення соковитих лусок червонувате. Середня кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 68,0-81,0 т/га, маса товарної цибулини 98-120 г, вегетаційний період 130 днів. Лежкість - 95%. Вміст вітаміну С, мг% - 9,5. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,0. Вміст загального цукру, % - 8,2.

05041040 Штутті

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Світязь"

Власник(и):

Підтримувач(i):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт сильний. Листок середньої довжини. Цибулина середньої розміру, низька, поперечноеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середньої товщини, жовтого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Мала кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 30,0 т/га, маса товарної цибулини 100 г, вегетаційний період 120 днів. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,0.

06041002 Яліско F1

Заявник: Нікерсон- Цваан Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт помірний. Листок середньої довжини. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, поперечновузькоеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середньої товщини, жовтого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Дуже мала кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 70,0 т/га, маса товарної цибулини 150 г, вегетаційний період 115 днів. Лежкість - 98%. Товарність - 9 балів.

Шпинат

06179001 Велетень

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Листкова пластинка має тупу форму верхівки, форма у поздовжньому розрізі опукла. У квітучих рослин мала частка однодомних рослин, середня кількість рослин з жіночими і чоловічими квітками.

Товарний урожай 420-455 ц/га; урожай ранньої продукції 250-350 ц/га; середня маса рослини 270-370 г; процент стрілкуючих 5-7; дегустаційна оцінка 4,6-4,8 балів; днів до досягнення 45-50; лежкість 70-75 %.

Гарбуз мускусний

05429001 Полянин

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Габітус рослини плетистий (тип довгоплетистий). Багато стебел. Стебло зелене, округло-гранчасте за формою, м'який тип опушенні. Форма листкової пластинки нирковидна, наявна розсіченість, поверхня гладенька. Плід циліндричної форми, поверхня сегментована, колір кори коричневий, структура м'якуша щільна.

Група стигlosti - середньостиглий; товарна урожайність 342 ц/га; урожайність ранньої продукції 300 ц/га; середня маса плоду 4100 г; період від повних сходів до початку дозрівання 128 днів; вміст сухої речовини в плоді 8,5 %; дегустаційна оцінка, балів: 4,6; транспортабельність 97 %.