

**06086004 Фаворит**

**Заявник:** Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

\* Трайдент х Редфрі.

Дерево помірної сили росту з колоноподібною формою крони. Тип плодоношення – на коротких пагонах. Однорічний пагін сильно опушений у верхній половині. Квітка велика. Пелюстки віночка перекриваються. Листкова пластинка довга, краї - пилчасті. Черешок довгий. Плід великий, кулясто-конічний, жовто-зелений з пурпуровим розмитим рум'янцем. М'якоть помірно пружна, кремова. Насінні комірочки частково відкриті.

За даними заявника за схеми садіння (2,5 x 0,5) x 0,5/2 середня врожайність становить 700 ц/га. Середня маса плоду - 160 г, максимальна - 190 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 7 балів. Стійкість проти борошнистої роси і парші - 7 балів. Група стиглості - пізньоосіння.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

Напрямок використання – десертний.

\* Дані заявника.

**Груша****97076002 Мрія**

**Заявник:** Кримська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

\* Ізюминка Криму х Деканка дю Коміс.

Дерево помірної сили росту, помірно гіллясте, пряме. Однорічний пагін прямий, коричнево-червоний з-під сонячного боку. Вегетативна брунька з гострою верхівкою, слабо відхилена від пагона. Молодий пагін у період швидкого росту із сильним антоціановим забарвленням. Верхня третина пагона помірно опушена. Листкова пластинка середнього розміру, з гострою основою і тупою верхівкою. Краї - гострозазублені. Черешок - довгий. Прилистки наявні. Пелюстки віночка округлі, доторкуються одна до одної. Приймочка розташована на рівні пиляків. Плід великий, жовтий з рожево-червоним відтінком. М'якоть слабо зерниста, м'яка, дуже соковита. Зернятка - яйцеподібні.

За даними заявника за схеми садіння 4 x 2,5 м середня врожайність становить 320 ц/га. Середня маса плоду - 290 г, максимальна - 340 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 9 балів, стійкий до парші - 8 балів та термічного опіку листя, скороплідний, сумісний з підщепами айви. Група стиглості - зимова.

Напрямок використання – у свіжому вигляді та для переробки.

Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп.

\* Дані заявника.