

Чорниця щиткова**06471001 Аманда 818М**

Заявник: Пітер Богдан Чикалюк

Власник(и):

Підтримувач(і):

Відбір серед диких видів.

* Кущ прямий, висотою 1,25-1,75 м. Листок - середньоширокий. Квітка середнього розміру з помірним антоціановим забарвленням. Ягода мала з помірним нальотом. Блакитне забарвлення ягоди після видалення нальоту - сильне. Ягода - помірно солодка.

За даними заявника за схеми садіння 3 x 1 м середній урожай з куща становить 8,6 кг. Середня маса ягоди - 0,8 г, максимальна - 1,0 г. Сорт зимостійкий - 8 балів. Група стиглості - середньопізня. Напрямок використання - споживання у свіжому вигляді, переробка, заморожування. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

06471003 Блустар 701М

Заявник: Пітер Богдан Чикалюк

Власник(и):

Підтримувач(і):

Природний відбір серед диких форм.

* Кущ прямий, висотою 1,25-1,75 м. Листок середньої ширини. Квітка середнього розміру з помірним антоціановим забарвленням. Ягода середня з помірним нальотом. Інтенсивність блакитного забарвлення шкірки після видалення нальоту помірна. Ягода - помірно солодка.

За даними заявника за схеми садіння 3 x 1 м середній урожай з куща становить 8,4 кг. Середня маса ягоди - 0,91 г, максимальна - 0,91 г. Сорт зимостійкий - 8 балів. Група стиглості - рання. Напрямок використання - споживання у свіжому вигляді, переробка.

Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

06471002 Джонні 716Л

Заявник: Пітер Богдан Чикалюк

Власник(и):

Підтримувач(і):

Подвійний природний відбір серед диких видів.

* Кущ прямий, висотою 1,25-1,75 м. Листок середньої ширини. Квітка середнього розміру з помірним антоціановим забарвленням. Ягода велика із сильним нальотом. Блакитне забарвлення шкірки після видалення нальоту слабе. Ягода - дуже солодка.

За даними заявника за схеми садіння 3 x 1 м середній урожай з куща становить 9,1 кг. Середня маса ягоди - 0,72 г, максимальна - 0,85 г. Сорт зимостійкий - 8 балів. Група стиглості - середньорання. Напрямок використання - споживання у свіжому вигляді, переробка, заморожування.

Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.