

396  
Виноград  
Виноград

### **07073008 Гвісне**

**Заявник:** Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Сорт пізньостиглий технічного напряму використання. Має 167 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Бруньки розгортаються в пізні строки. Верхівки молодих пагонів напівліні. Верхній бік листкової пластинки молодого листка зелений з антоціановими плямами. Положення пагона у просторі напівпрямe. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений, вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений із червоними штрихами (смугами). Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середній за розміром, округлий, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листкових вирізів слабко перекриваються, біля черешка - широко відкриті. Глибина верхніх листкових вирізів дуже глибока. Зубці довгі, обидва боки випуклі. Черешок трохи коротший за головну жилку. Грона середнього розміру, середньої щільності, ніжка середньої довжини. Ягода середня кругла, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору середньої товщини. М'якоть дуже соковита, м'яка. Насіння повноцінне.

Здерев'янілі пагін червонувато-коричневий, ребристий.

\* Дані заявитника.

Сорт пізньостиглий технічного напряму використання, у середньому 167 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Середньостійкий проти міldью, сірої гнилі, оїдіуму, філоксери. Середня врожайність – 154 ц/га, середня маса грона – 176 г, середня маса 100 ягід – 120 г. Цукристість – 27 %, кислотність – 7,5 г/л. Вихід соку (сусла) – 66 %. Зимостійкість середня. Десертне вино. Рекомендовано вирощувати у 6-ї виноградарській зоні України.

\* Дані заявитника.

### **07073009 Гранатовий Магарача**

**Заявник:** Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Сорт ранньостиглий технічного напряму використання. Має 126 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівки молодих пагонів відкриті повністю, рідким опушеннем нижньої сторони. Верхній бік листкової пластинки молодого листка світлий мідно - червоний. Положення пагона у просторі горизонтальне. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів червоний, вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений із червоними штрихами (смугами). Розвинений листок за розміром середній, округлий, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листкових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Глибина верхніх листкових вирізів глибока. Зубці короткі, обидві сторони випуклі. Черешок трохи коротший за головну жилку. Грона за розміром середнє, середньої щільності, ніжка - коротка. Ягода середня тупо-яйцеподібна, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору середньої товщини. М'якоть соковита, м'яка. Насіння повноцінне.

Здерев'янілі пагін червонувато-коричневий, борознистий.

\* Дані заявитника.

\* Сорт дуже ранньостиглий технічного напряму використання, у середньому 126 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti. Стійкий до міldью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 134 ц/га, середня маса грона – 187 г, середня маса 100 ягід – 215 г. Цукристість – 27,5 %, кислотність – 7,7 г/л. Вихід соку (сусла) - 68 %. Зимостійкість середня. Десертне вино. Рекомендовано вирощувати у 6-ї

виноградарській зоні України.

\* Дані заявника.

## 07073007 Красень

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магараж" Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Сорт пізньостиглий технічного напрямку використання. 156 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівки молодих пагонів напіввідкриті, листки жовто - зелені, з рідким опущенням нижньої сторони. Верхній бік листкової пластинки молодого листка жовто-зелений. Положення пагона у просторі напівпряме. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середній за розміром п'ятикутний, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листкових вирізів відкриті, біля черешка - слабко перекриваються. Глибина верхніх листкових вирізів глибокі. Зубці середньої довжини, обидва боки прямолінійні. Черешок однакової довжини із головною жилкою. Гроно середньовелике, середньої щільноті, ніжка - середньої довжини. Ягода середня овальна, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору товста. М'якоть соковита, м'яка. Насінняrudimentарне.

Здерев'янілий пагін темно-коричневий, ребристий.

\* Дані заявника.

\* Сорт пізньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 156 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, міldью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 151 ц/га, середня маса грана – 268 г, середня маса 100 ягід – 234 г. Цукристість – 26,3 %, кислотність – 7,5 г/л. Вихід соку (сусла) 78 %. Зимостійкість середня. Десертне вино. Рекомендовано вирощувати у 6-ї виноградарській зоні України.

\* Дані заявника.

## 07073006 Пам'яті Голодриги

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магараж" Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Сорт пізньостиглий технічного напрямку використання. 151 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівки молодих пагонів повністю відкриті. Верхній бік листкової пластинки молодого листка жовто - зелений. Положення пагона у просторі напівпряме. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, довгі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок великий за розміром, серцевидний, з семи лопатей. Лопаті верхніх листкових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Глибина верхніх листкових вирізів - глибокі. Зубці короткі, обидва боки випуклі. Черешок трохи коротший за головну жилку. Гроно середнього розміру, нещільне, ніжка - коротка. Ягода середня еліптична, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору середньої товщини. М'якоть соковита, тверда. Насіння повноцінне.

Здерев'янілий пагін червонувато-коричневий, борозенчастий.

\* Дані заявника.

Урожайність - 134 ц/га, середня маса грана 208 г, середня маса 100 ягід 219 г, вихід соку - 62%, цукристість соку ягід - 25,7%, вміст кислот у ягодах - 8,6 %, Днів від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної стиглості) - 151; стійкість до хвороб - 7 балів, стікість до несприятливих метеорологічних умов - 7 балів Рекомендовано вирощувати в 6-й виноградарській зоні України.