

виноградарській зоні України.

* Дані заявника.

07073007 Красень

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт пізньостиглий технічного напрямку використання. 156 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівки молодих пагонів напіввідкриті, листки жовто - зелені, з рідким опушенням нижньої сторони. Верхній бік листової пластинки молодого листка жовто-зелений. Положення пагона у просторі напівпряме. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середній за розміром п'ятикутний, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті, біля черешка - слабо перекиваються. Глибина верхніх листових вирізів глибокі. Зубці середньої довжини, обидва боки прямолінійні. Черешок однакової довжини із головною жилкою. Гроно середньовелике, середньої щільності, ніжка - середньої довжини. Ягода середня овальна, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору товста. М'якоть соковита, м'яка. Насіння рудиментарне.

Здерев'янілий пагін темно-коричневий, ребристий.

* Дані заявника.

* Сорт пізньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 156 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Стійкий до філоксери, мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 151 ц/га, середня маса грона – 268 г, середня маса 100 ягід – 234 г. Цукристість – 26,3 %, кислотність – 7,5 г/л. Вихід соку (сусла) 78 %. Зимостійкість середня. Десертне вино. Рекомендовано вирощувати у 6-ій виноградарській зоні України.

* Дані заявника.

07073006 Пам'яті Голодриги

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт пізньостиглий технічного напрямку використання. 151 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівки молодих пагонів повністю відкриті. Верхній бік листової пластинки молодого листка жовто - зелений. Положення пагона у просторі напівпряме. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений із червоними штрихами (смугами), вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений. Послідовних вусиків менше трьох, довгі. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок великий за розміром, серцевидний, з семи лопатей. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Глибина верхніх листових вирізів - глибокі. Зубці короткі, обидва боки випуклі. Черешок трохи коротший за головну жилку. Гроно середнього розміру, нещільне, ніжка - коротка. Ягода середня еліптична, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору середньої товщини. М'якоть соковита, тверда. Насіння повноцінне.

Здерев'янілий пагін червонувато-коричневий, борозенчастий.

* Дані заявника.

Урожайність - 134 ц/га, середня маса гроно 208 г, середня маса 100 ягід 219 г, вихід соку - 62%, цукристість соку ягід - 25,7%, вміст кислот у ягодах - 8,6 %, Днів від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної стиглості) - 151; стійкість до хвороб - 7 балів, стійкість до несприятливих метеорологічних умов - 7 балів Рекомендовано вирощувати в 6-й виноградарській зоні України.