

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 19101006 Назва сорту: Вітаверде **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.08.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210601

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	вузький	3	
7	Листок: відношення ширина/довжина	мале	3	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	сильна	7	
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3	
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2	
13	Листок: пухирчатість	сильна	7	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно широко-еліптична	2	
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	помірне	5	
21	Головка: забарвлення	зелене	4	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення	жовте	2	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	пізня	7	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	від раннього до середнього осіннього типу	4	
28	Чоловіча стерильність	повна	3	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 18. Товарна врожайність, т/га – 14. Період від повних сходів до початку достигання, днів – 75. Період плодоношення, днів – 10. Вміст білка, % – 2; вітаміну С, мг% – 50; загального цукру, % – 2,1; сухої речовини, % – 5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизивий – 5; бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.