

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus L. var. sativus Pers.*

Заявка № 19118001 Назва сорту: Даніло **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.08.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210611

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Пloidість	диплойд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9	
3	Сім`ядолі: розмір	середній	5	
4	Листкова розетка: за ширину основи	широка	7	
5	Листок: положення у просторі	напівпрямe	3	
6	Листок: за довжиною	довгий	7	
7	Листкова пластинка: форма	оберненояйцеподібна	3	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	струватий	3	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мала	3	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3	
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
17	Коренеплід: діаметр	середній	5	
18	Коренеплід: головний корінь за ширину	вузький	3	
19	Коренеплід: форма	поперечноеліптична	1	
20	Коренеплід: форма верхівки	плескати	2	
21	Коренеплід: форма основи	плескати	5	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	багряне	2	
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір блій верхівки	ознака не визначається	0	
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3	
27	Коренеплід: основне забарвлення мякоті	матове біле	2	
28	Час досягнання	ранній	3	
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1	
30	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
31	Коренеплід: форма плача	плескати	1	

За інформацію наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 25. Тривалість періоду до досягнання, діб – 40. Середня маса плоду, г – 25. Вміст сухої речовини, % – 1,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana Fuck.*) – 7; гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 8; чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.