

профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, горбкуватість зовнішнього листа відсутня, колір з восковим нальотом фіолетовий, восковий наліт сильний. Форма поздовжнього розрізу качана округла, форма основи у поздовжньому розрізі зростаюча, інтенсивність забарвлення покривних листків середня, внутрішнє забарвлення качана фіолетове, дуже щільна головка, розтріскування качана після дозрівання відсутнє. Загальна урожайність 600/га, товарність 96%, маса товарного плоду 1,9-2,1 кг, щільність головки 8,5 бала, дегустаційна оцінка 8,0 бала, транспортабельність 9,0 балів. Напрямок використання: у свіжому вигляді та для переробки.

**ФУЕГО F1.** Заявник фірма “Клюз Тезьє” Франція, середньопізньої групи достигання (130-140 днів). Розетка велика, напівпіднята, Листя великого розміру, темно-червоного кольору, спрямоване до гори, краї листка слабо-хвилясті, жилкування сильне, поверхня горбкувата. Злегка покрита восковим нальотом. Головка в розрізі овальна темно-червоного кольору. Покривні листки на вершині гладенькі, в основі морщинисті. Середня маса головки 1,5-3 кг, вирівняні. Загальна врожайність 25 – 50 т/га, товарність 98%, лежкість 8,6 балів, головки щільні 8,5 балів, стійкі до розтріскування. Смакові якості добрі 8,5 балів. Відносно стійкі проти ураження судинним і слизовим бактеріозом.

### КАПУСТА САВОЙСЬКА

**ВЕРТЮ 1340.** Всеросійський науково-дослідний інститут селекції і насінництва овочевих культур. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, універсального (крім заквашування) призначення. Vegetaційний період - 108-155 днів. Розетка середнього розміру з напівпіднятими листками. Головка округло-плеската, морщиниста, середньо-щільна, в розрізі жовта або жовто-зелена, масою - 1,0 - 2,0 кг. Дегустаційна оцінка - 8,8 бала. Вміст сухої речовини - 9,8%, цукру - 3,5%, вітаміну С - 42,1 мг%. Врожайність - 200-400 ц/га. Середньо-стійка до ураження грибковими хворобами. Лежкість і транспортабельність задовільні.

### КАПУСТА БРЮССЕЛЬСЬКА

**ГЕРКУЛЕС.** Всеросійський науково-дослідний інститут селекції і насінництва овочевих культур. Рекомендований для вирощування в Лісостепу і Степу, середньопізній, консервного і столового призначення. Vegetaційний період - 126-150 днів. Рослини 40-50 см заввишки з малоліроподібними листками на довгих черешках. Головки формуються на стеблі в пазухах листків у вигляді конуса. Форма головок овальна, у діаметрі (нижні більші) 3-5 см, масою - 8-14 г, рихлі, в розрізі зелено-жовті. На рослині формується до 70 шт. головок. Вміст сухої речовини - 14,5%, цукру - 3,2%, протеїну - до 6%, вітаміну С - 122,3 мг%. Рослини холодостійкі і стійкі до грибкових хвороб. Урожайність - 50-80 ц/га. Лежкість і транспортабельність задовільні.

**ФІЛІМОН.** Заявник фірма „Сінгента” (Нідерланди). Пізній сорт, консервного і столового призначення. Vegetaційний період - 150-180 днів. Рослина середньої висоти. Головки формуються на стеблі в пазухах листків у вигляді конуса, дуже однорідні, мають яскраво-