

Високоврожайний сорт універсального напрямку використання. Хворобами уражується слабко. Рекомендований для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

ХАРКІВСЬКА. Заявник Інститут овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, універсального призначення. Вегетаційний період - 115 днів. Цибулина округла, гостра на смак, масою - 58 г. Покривні луски світло-коричневі з мідним відтінком; соковиті - білі, середньої товщини. Вміст сухої речовини - 11,9%, цукру - 8,8%, вітаміну С - 10,7 мг%. Урожайність - 205 ц/га. Ураження пероноспорозом до 22%. Транспортабельність і лежкість високі.

ЯЛТИНСЬКА МІСЦЕВА. Дослідна станція овочівництва кримського аграрного інституту УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Степу, пізньостиглий, салатного призначення. Вегетаційний період - 130-150 днів. Цибулина плескато- округла, десертного (солодкого) смаку, масою - 100-150 г. Покривні луски фіолетові з червонуватим відтінком; соковиті - світло-фіолетові, товсті. Вміст сухої речовини - 10-11%, цукру - 5-7%, вітаміну С - 10-12 мг%. Урожайність - 250-300 ц/га. Схильний до ураження грибковими хворобами. Транспортабельність добра, лежкість задовільна (добре зберігається до січня).

ЦИБУЛЯ-ПОРЕЙ

ДУРІПШСЬКА. Сухумська дослідна станція субтропічних культур. Рекомендований для вирощування в Лісостепу та Степу, пізньостиглий, салатного та кулінарного призначення. Вегетаційний період - 160 днів. Листки лінійні широкі. Цибулина у вигляді відбліленої ніжки, 20-25 см. завдовжки і 6-8 см. у діаметрі, масою - до 360 г. М'якуш білий, ніжний, напівгострий на смак. Покривні луски відсутні. Вміст сухої речовини - 12,2%, цукру - 5,6%, вітаміну С - 5,1 мг%. Урожайність - 235 ц/га. Стійкий до ураження грибковими хворобами. Транспортабельність і лежкість задовільна.

ЙОЛАНТ. Заявник фірма "Бейо Заден" (Нідерланди). Рекомендований для вирощування в усіх зонах, ранньостиглий, салатного та кулінарного призначення. Вегетаційний період - 86 днів. Листки лінійні широкі. Цибулина у вигляді відбліленої ніжки, 30-35 см. Завдовжки, 6,0-8,5 см. у діаметрі, масою - 120 г. М'якуш білий, ніжний, напівгострий на смак. Покривні луски відсутні. Вміст сухої речовини - 10,8%, цукру - 9,1%, вітаміну С - 5,8 мг%. Урожайність - 364 ц/га. Стійкий до ураження грибковими хворобами. Транспортабельність і лежкість задовільна.

СВІТ ДЖАНАТ F1. Заявник фірма „Сінгента” (Нідерланди). Рекомендований для вирощування в усіх зонах, пізньостиглий, салатного та кулінарного призначення. Вегетаційний період - 154 днів. Листки лінійні широкі. Цибулина у вигляді відбліленої ніжки, 30-35 см завдовжки , 6-8 см у діаметрі, масою - 134 г. М'якуш білий, ніжний, напівгострий на смак. Покривні луски відсутні. Вміст сухої

речовини - 17,3%, цукру - 5,3%, вітаміну С - 5,9 мг%. Врожайність - 350 ц/га. Стійкий до ураження грибковими хворобами. Транспортабельність і лежкість задовільна.

ЧАСНИК

СОФІЙСЬКИЙ. Заявник Уманська державна аграрна академія. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу, озимий стрілкуючий, універсального призначення. Вегетаційний період - 101 день. Листки темно-зелені, широкі. Цибулина округло-плескаті, масою - 18 г. Покриті 3-4 зовнішніми лусками світло-фіолетового забарвлення. У цибулині 7-8 зубків. Вміст сухої речовини - 46,9%, вітаміну С - 7,9 мг%. Урожайність - 80-120 ц/га. Середньо-стійкий до ураження грибковими хворобами. Транспортабельність і лежкість добри.

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ. Заявник Луганський інститут агропромислового виробництва. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, озимий стрілкуючий, універсального призначення. Вегетаційний період - 120-160 днів. Листки темно-зелені, середньо-широкі. Цибулина округло плескаті, масою - 26 г. Покриті 4-5 зовнішніми лусками, білого забарвлення з фіолетово- рожевим відтінком. В цибулині 4-6 зубків. Вміст сухої речовини - 40,3%, вітаміну С - 8,1 мг%. Урожайність - 70-120 ц/га, повітряних - 11-13 ц/га. Середньо-стійкий до ураження грибковими хворобами і нематодою. Транспортабельність добра, лежкість середня.

УКРАЇНСЬКИЙ БІЛИЙ. Заявник Запорізька державна сільськогосподарська станція. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу, ярий нестрілкуючий, універсального призначення. Вегетаційний період - 100-120 днів. Листки зелені, вузькі. Цибулина неправильної форми, дуже щільна, масою - 20-25 г. Покриті 4-5 зовнішніми лусками, білувато-бурого забарвлення. У цибулині 10-12 зубків. Вміст сухої речовини - 36%, вітаміну С - 6,4 мг%. Урожайність - 30-50 ц/га. Відносно стійкий до грибкових хвороб і нематоди. Транспортабельність і лежкість відмінні.

ХАРКІВСЬКИЙ ФІОЛЕТОВИЙ. Заявник Інститут овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Степу, озимий стрілкуючий, універсального призначення. Вегетаційний період - 90-115 днів. Листки темно-зелені, широкі. Цибулина округло-плескаті, щільна, масою - 34 г. Покриті 4-6 зовнішніми лусками, білого забарвлення з яскравими фіолетово-червоними смугами. У цибулині 4-6 зубків. Вміст сухої речовини - 37,7-47,1%, вітаміну С - 12,8-16,4 мг%. Урожайність - 100 ц/га, повітряних - 8-12 ц/га. Відносно стійкий до грибкових хвороб і нематоди. Транспортабельність добра, лежкість середня.

ЮВІЛЕЙНИЙ ГРИБІВСЬКИЙ. Внесений до Реєстру сортів рослин України у 1964 році. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, озимий стрілкуючий, універсального призначення. Вегетаційний період - 83-122 дні. Листки матово-зелені, широкі. Цибулина округло-плескаті, щільна, масою - 22-24 г. Покриті 4-6 лусками білувато-фіолетового забарвлення з темно-фіолетовими смугами. В