

цибулині 5-8 зубків. Вміст сухої речовини - 41%, вітаміну С - 9,8 мг%. Урожайність до 125 ц/га. Стійкий до ураження грибковими хворобами. Транспортабельність добра, лежкість задовільна.

ПОМІДОР

АТОЛЬ F1. Заявник фірма "ПНОС" (Польща). Рослина детермінантного типу, стебло гнучке, опушеність стебла слабка. Плоди крупні масою 150г. круглої форми, червоного кольору в фазі повної стиглості, колір м'якоті червоний, в поперечному розрізі звичайно має 3-4 дольки, з тонким перикатпієм. Загальна врожайність 412 ц/га. Вміст сухої речовини у фазі досягання 6,3-5,6%, загального цукру 3,4%, вітаміну С 20,6 мг%. Сорт ранній, період досягання з моменту висадки розсади, становить 95 дні. Самостійно закінчуючий ріст. Вирощується у відкритому ґрунті. Універсального напрямку використання. Стійкий до хвороб: вертицильозне в'янення, фузаріоз, альтернаріоз, стійкий до картопляної язви.

БАЛЛАДА. Заявник Агрофірма "Наско" та Придністровський НДІ сільського господарства куш детермінантний, стебло негнучке, опушеність середня, кількість листків після першого суцвіття мала, довжина міжвузля середня. Довжина листка середня, ширина середня, перисторозсічені, зеленого забарвлення. Тип суцвіття звичайний утворює одну гілку при кожному розгалуженні. Квітка жовтого кольору, фастація – відсутня, маточка не опушена. Плід великий, округло-видовженої форми, яскраво – червоний маса товарного плоду 140 – 150 г. Дегустаційна оцінка – 4,8 – 5,0 балів. Вміст сухої речовини в плоді 5,5 – 6,5%, цукру 3,5 – 5,0%, аскорбінової кислоти 20,1 – 42,6 мг%. Середньостиглий, вегетаційний період від масових сходів до першого збору 110 – 115 днів. Транспортабельний, плоди смачні, придатні для використання у свіжому вигляді і на томатопродукти. Стійкий до ураження хворобами. Вирощується у відкритому і закритому ґрунті.

БОЯН. Заявник Сквирський науково-дослідний центр інституту овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу і Степу, ранньостиглий, універсального призначення, середньостійкий до ураження грибковими хворобами. Вегетаційний період - 122 дні. Куш середньо-рослий, детермінантний, середньооблиственний. Плід сливовидний, червоний, масою - 52 г. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8,2 бали. Вміст сухої речовини - 5,8-6,4%, цукру - 2,4-2,6%, вітаміну С - 16,8-17,0 мг%. Урожайність - 281 ц/га. Транспортабельність добра.

ВЕСНЯНИЙ. Заявник Інститут овочівництва та баштанництва УААН. Гетерозисний гібрид. Ранньостиглий. Вегетаційний період 100 – 112 днів. Для весняних теплиць без обігрівання. Стійкий проти ВТМ, стрійку, бурої плямистості, відносно стійкий проти фузаріозу і альтернаріозу. Транспортабельний. Загальна врожайність 13,5 – 15,0 кг/м, за перший місяць плодоношення – 7,0-8,5. Куш індетермінантний, середньорослий і середньооблиственний. Плід округло-плесканий, гладенький, червоний, без зеленої плями біля плодоніжки, масою 105 – 120 г. Вміст сухої речовини 5,2-5,5%, загального цукру – 2,9-3,1%, вітаміну С – 17-19 мг%.