

перероблених - 8,0 бали. Вміст сухої речовини - 6,0%, цукру - 2,4%, вітаміну С - 29,5 мг%, - каротину - 3,4 мг%. Урожайність - 494-818 ц/га. Лежкість і транспортабельність задовільна.

ДЬЮАЛ ЕРЛІ F1. Заявник фірма "СВС Холанд"(Нідерланди). Рослина детермінантного типу, стебло гнучке, опушеність стебла середня, середня кількість листків після першого суцвіття, довжина міжвузля між 1-им та 4-им суцвіттям коротке. Положення листя поникле, перисто-розсічені, зеленого кольору, антоціанове забарвлення жилок відсутнє. Квітка жовтого кольору, опушеність маточки відсутнє, фастанція утворення пучків відсутня. Плоди крупні округло плескатої форми, червоного кольору в фазі повної стиглості, колір мякоти червоний, в поперечному розрізі звичайно має 3-4 локули, з тонким перикарпієм. Середня маса плоду 150 г. Вміст сухої речовини у фазі досягання 5,0%, загального цукру 2,8%, вітаміну С 16,1 мг%. Середньоранній, період досягання, з моменту висадки розсади, становить 115 дні. Вирощується у відкритому ґрунті. Стійкий до хвороб: вертиціольозне в'янення, фузаріоз.

ЖЕНАРОС F1. Заявник „Де Ройтер сіде” (Нідерланди). Середньоранній гібрид генеративного типу. Красиві, плоско-округлі, однорідні плоди вагою 230 г, злегка ребристі. Великий середньо рослий кущ, дуже гарне зав'язування плодів навіть при перегрівках, виносить важкі умови вирощування, стійкий до нематоди і розтріскування плодів.

ЗОРЕНЬ. Внесений до Реєстру сортів рослин України у 1991 році. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу, середньоранній, універсального призначення, схильний до ураження грибковими хворобами. Вегетаційний період - 105-110 днів. Кущ середнього розміру, детермінантний. Плід округлий, червоний, масою - 90-110 г. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8,2 бали. Вміст сухої речовини - 5,4-6,0%, цукру - 3,1-3,5%, вітаміну С - 19,8-21,5 мг%. Урожайність - 420-640 ц/га. Лежкість і транспортабельність задовільна.

КАСПАР F1. Заявник фірма "СВС Холанд"(Нідерланди). Середньостиглий гібрид універсального напрямку використання. Рослина детермінантного типу росту. Стебло: гнучке, опушеність слабка, кількість листків після першого суцвіття середня, довжина міжвузлів середня. Листя: положення горизонтальне, середнього розміру перисто-розсічені, зеленого кольору. Плоди середнього розміру, грушоподібної форми з слабкою ребристістю, тонким перикарпієм, має 3-4 локули, рожевого кольору, колір епідермісу безбарвний. Загальна врожайність 650 ц/га, товарність 96%, маса товарного плоду 90 г, період від повних сходів до початку дозрівання 111 днів. Вміст сухої речовини 6,2%, загального цукру 4,0 мг%, вітаміну С 13,2мг%. Стійкий до фузаріозу.

КМІЦЦ. Заявник фірма ПНОС (Польща). Сорт середньостиглий, для вирощування у відкритому ґрунті, самостійно закінчуючий ріст, тонкостебельний. Рослини густі і досить високі. Плоди в середньому масою 50-60 г, продовгуваті, грушоподібні, з гладенькою поверхнею, червоного кольору. Характерною особливістю є генетично обумовлена без колінна плодоніжка, завдяки чому плоди легко відділяються від рослини, плоди яскраво-червоного кольору, мають 2-3 камери, дуже тверді, не розтріскуються на рослині та не мнуться при