

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 15012028 Назва сорту: ЛІНУС Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171369

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака  | Проявлення               | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1  | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення                   | відсутнє або дуже слабка | 1   |
| 2  | Рослина: форма куща (габітус)   | напівпрямий              | 3   |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                     | відсутнє або дуже слабке | 1   |
| 4  | Кількість рослин із згинутим прапорцевим листком                      | відсутня або дуже мала   | 1   |
| 5  | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)           | пізній                   | 7   |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві                           | дуже сильний             | 9   |
| 7  | Колос: восковий наліт   | сильний                  | 7   |
| 8  | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі                        | сильний                  | 7   |
| 9  | Рослина: за висотою (стебло і колос)                                  | низька                   | 3   |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | слабко виповнена         | 3   |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку)   | циліндрична              | 2   |
| 12 | Колос: за щільністю   | щільний                  | 7   |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців)                             | середній                 | 5   |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок                        | навіть зубці             | 2   |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною                         | короткі                  | 3   |
| 16 | Колос: забарвлення  | біле або солом'яно-жовте | 1   |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла                   | слабке                   | 3   |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)  | відсутнє або дуже вузьке | 1   |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою                               | округле                  | 2   |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною                            | короткий                 | 3   |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою                              | середньо згинутий        | 5   |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні                  | слабке                   | 3   |
| 23 | Нижня квітова луска. Зубець: за формою                                | дуже згинутий            | 4   |
| 24 | Зернівка: забарвлення   | червоне                  | 2   |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі  | світле                   | 3   |
| 26 | Тип розвитку  | озимий                   | 1   |
| 27 | Зернівка: за довжиною   | коротка                  | 3   |
| 28 | Зернівка: за шириною  | середня                  | 5   |
| 29 | Зернівка: відношення довжина/ширина                                   | середнє                  | 5   |
| 30 | Зернівка: за крупністю  | дрібна                   | 3   |
| 31 | Язичок: виявлення   | короткий                 | 3   |
| 32 | Нижня квітова луска: кіль   | відсутній                | 1   |
| 33 | Вушка: за формою  | гострі                   | 2   |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні                         | слабке                   | 3   |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)    | овально-ланцетна         | 3   |

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник  | Значення |      |        |
|---|----------|------|--------|
|   | С        | Л    | П      |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 53,1     | 62,9 | 55,6   |
| Довірчий інтервал, ц/га (±)   | 0,8      | 0,7  | 0,6    |
| Урожайність, ц/га   | 57,9     | 72,5 | 66,9   |
| +,- до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га                                      | 4,8      | 9,6  | 11,3   |
| +,- до усередненого значення за 5 попередніх років, %   | 9        | 15   | 20     |
| Тривалість періоду вегетації, діб   | 262      | 268  | 277    |
| Висота рослин, см   | 71,5     | 78,4 | 73,1   |
| Маса 1000 зерен, г  | 37,3     | 43,4 | 44,8   |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал  | 8,2      | 8,4  | 8,3    |
| Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал     |          |      | низька |
| Стійкість до вилягання, бал   | 9,0      | 9,0  | 8,9    |
| Стійкість до обсіпання, бал   | 9,0      | 8,9  | 9,0    |
| Стійкість до посухи, бал  | 8,6      | 8,5  | 8,6    |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал   | 8,4      | 8,7  | 9,0    |
| Стійкість проти бурі іржі, бал  | 9,0      | 9,0  | 8,9    |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал   | 9,0      | 8,9  | 8,9    |
| Якість:   |          |      |        |
| Вміст білка, %  | 14,0     | 13,7 | 13,7   |
| Вміст клейковини, %   | 28,2     | 27,5 | 27,7   |
| Сила борошна (W), о.а.  | 262      | 230  | 200    |
| Об'єм хліба, мл   | 980      | 950  | 950    |
| За хлібопекарськими якостями  | ц        | ф    | ф      |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.