

**Вид:** Овес посівний (ярий) *Avena sativa L.*

**Заявка № 19011001 Назва сорту:** Кузьма Носівський **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

**Дата пріоритету:** 14.11.2019

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 29.10.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210853**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|--|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Рослина: габітус   | напівпрямий              | 3   |          |
| 2  | Найнижчі листки: опущення пластинки                                  | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 3  | Листкова пластинка: опущення країв листка                            | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 4  | Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками         | часто                    | 7   |          |
| 5  | Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок) | середній                 | 5   |          |
| 6  | Стебло: опущення найвищого вузла                                     | відсутнє                 | 1   |          |
| 7  | Стебло: інтенсивність опущення найвищого вузла                       | дуже слабка              | 1   |          |
| 8  | Волоть: орієнтація гілочек   | одногрива                | 1   |          |
| 9  | Волоть: положення гілочек  | пряме                    | 1   |          |
| 10 | Волоть: положення вторинних колосків                                 | поникле                  | 2   |          |
| 11 | Колоскові луски: сіруватість   | помірна                  | 5   |          |
| 12 | Колоскові луски: за довжиною   | середні                  | 5   |          |
| 13 | Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски               | наявна                   | 9   |          |
| 14 | Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски | помірна                  | 5   |          |
| 15 | Рослина: за висотою  | середня                  | 5   |          |
| 16 | Волоть: за довжиною  | довга                    | 7   |          |
| 17 | Зернівка: плівка   | наявна                   | 9   |          |
| 18 | Первинна зернівка: тенденція до остистості                           | слабка                   | 3   |          |
| 19 | Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною                  | середня                  | 5   |          |
| 20 | Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски                        | жовте                    | 2   |          |
| 21 | Первинна зернівка: опущення спинки нижньої квіткової луски           | відсутнє                 | 1   |          |
| 22 | Первинна зернівка: опущення основи                                   | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 23 | Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною                      | короткі                  | 3   |          |
| 24 | Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною              | середній                 | 5   |          |
| 25 | Тип розвитку   | ярий                     | 2   |          |

#### Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник  | Значення |      |   |
|---|----------|------|---|
|   | С        | Л    | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 4,12     | 3,69 |   |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га  | 5,06     | 4,47 |   |
| +,- до усередненої урожайності, т/га  | 0,94     | 0,78 |   |
| +,- до усередненої урожайності, %   | 22,8     | 21,2 |   |
| Довірчий інтервал, т/га   | 0,27     | 0,15 |   |
| Тривалість періоду вегетації, діб   | 91       | 86   |   |
| Висота рослини, см  | 99,1     | 95,3 |   |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г   | 34,3     | 32,5 |   |
| Вміст білка, %  | 12,4     | 11,9 |   |
| Плівковість, %  | 25,1     | 24,2 |   |
| Стійкість до вилягання, бал   | 7        | 7    |   |
| Стійкість до обсипання, бал   | 9        | 9    |   |
| Стійкість до посухи, бал  | 8        | 7    |   |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал   | 9        | 8    |   |
| Стійкість проти корончастої іржі, бал   | 9        | 7    |   |
| Стійкість проти твердої сажки, бал  | 9        | 9    |   |
| Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал  | 9        | 9    |   |
| Напрям використання   | X        | X    |   |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**