

**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

**Заявка № 18012022 Назва сорту:** Красуня Поліська **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.10.2021 **Патент № 210884**

**Дата пріоритету:** 20.03.2018

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.10.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210831**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення               | Код | Примітка   |
|----|---|--------------------------|-----|------------|
| 1  | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення                   | відсутня або дуже слабка | 1   | до слабкої |
| 2  | Рослина: габітус (форма куща)   | напіврозлогий            | 5   |            |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                     | відсутнє або дуже слабке | 1   |            |
| 4  | Кількість рослин із згинутим прапорцевим листком                      | середня                  | 5   |            |
| 5  | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)           | середній                 | 5   |            |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на півхві                          | помірний                 | 5   |            |
| 7  | Колос: восковий наліт   | помірний                 | 5   |            |
| 8  | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі                        | помірний                 | 5   |            |
| 9  | Рослина: за висотою (стебло і колос)                                  | середня                  | 5   | до високої |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | слабко виповнена         | 3   |            |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку)   | циліндрична              | 2   |            |
| 12 | Колос: за щільністю   | нещільний                | 3   |            |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців)                             | довгий                   | 7   |            |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок                        | наявні зубці             | 2   |            |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною                         | дуже короткі             | 1   |            |
| 16 | Колос: забарвлення  | біле або солом'яно-жовте | 1   |            |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла                   | помірне                  | 5   |            |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)  | середнє                  | 5   |            |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою                               | пряме                    | 3   |            |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною                            | дуже короткий            | 1   |            |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою                              | прямий                   | 1   |            |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні                  | слабке                   | 3   |            |
| 23 | Нижня квіткова луска. Зубець: за формою                               | з дуже значним перегином | 5   |            |
| 24 | Зернівка: забарвлення   | червоне                  | 2   |            |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі  | помірне                  | 5   |            |
| 26 | Тип розвитку  | озимий                   | 1   |            |
| 27 | Зернівка: за довжиною   | середня                  | 5   |            |
| 28 | Зернівка: за шириною  | середня                  | 5   |            |
| 29 | Зернівка: відношення довжина/ ширина                                  | середнє                  | 5   |            |
| 30 | Зернівка: за крупністю  | крупна                   | 7   |            |
| 31 | Язичок: виявлення   | короткий                 | 3   |            |
| 32 | Нижня квіткова луска: кіль  | відсутній                | 1   |            |
| 33 | Вушка: за формою  | гострі                   | 2   |            |
| 34 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні                   | слабке                   | 3   |            |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)    | овально-ланцетна         | 3   |            |

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник  | Значення |       |       |
|---|----------|-------|-------|
|   | С        | Л     | П     |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,19     | 6,69  | 5,99  |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га  | 5,03     | 6,77  | 5,75  |
| +, - до усередненої урожайності, т/га   | -0,16    | 0,08  | -0,24 |
| +, - до усередненої урожайності, %  | -3,1     | 1,3   | -4,1  |
| Довірчий інтервал, т/га   | 0,06     | 0,05  | 0,04  |
| Тривалість періоду вегетації, діб   | 265      | 262   | 274   |
| Висота рослини, см  | 100,2    | 101,4 | 104,4 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г   | 41,3     | 45,2  | 41    |
| Вміст білка, %  | 14,3     | 14,3  | 13,7  |
| Вміст сирової клейковини, %   | 28,9     | 29,3  | 28,2  |
| Сила борошна (W), о.а.  | 260      | 283   | 300   |
| Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл  | 950      | 1030  | 1040  |
| Стійкість до вилягання, бал   | 7        | 8     | 7     |
| Стійкість до обсипання, бал   | 9        | 9     | 9     |
| Стійкість до посухи, бал  | 7        | 7     | 6     |
| Стійкість проти борошністої роси, бал   | 7        | 7     | 7     |
| Стійкість проти бурі іржі, бал  | 7        | 7     | 7     |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал   | 9        | 7     | 6     |
| Стійкість проти мухи шведської, бал   | 8        | 9     | 9     |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал  | 9        | 8     | 9     |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал  | 8        | 8     | 7     |
| Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал     | 8,0      |       |       |
| Блок  | 1        | 1     | 1     |
| Напрямок використання   | цїн      | слн   | цїн   |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**