

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012050 Назва сорту: ПАБАТКА Заявник (код): 386 Власник сорту (код): 386

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.10.2021 Патент № 210900

Дата пріоритету: 20.12.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.10.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210816

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 2 | Рослина: габітус (форма куща) | напівпрямий | 3 | |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 4 | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком | середня | 5 | |
| 5 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | середній | 5 | |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | сильний | 7 | |
| 7 | Колос: восковий наліт | помірний | 5 | |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | помірний | 5 | |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | середня | 5 | |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | слабо виповнена | 3 | |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | циліндрична | 2 | |
| 12 | Колос: за щільністю | середній | 5 | |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців) | середній | 5 | |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні остюки | 3 | |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною | дуже довгі | 9 | |
| 16 | Колос: забарвлення | біле або солом'яно-жовте | 1 | |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | слабке | 3 | |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса) | вузьке | 3 | |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою | піднесене | 4 | |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною | середній | 5 | |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою | середньо зігнутий | 5 | |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | слабке | 3 | |
| 23 | Нижня квітова луска. Зубець: за формою | ознака не визначається | 0 | |
| 24 | Зернівка: забарвлення | біле | 1 | |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | помірне | 5 | |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 | |
| 27 | Зернівка: за довжиною | середня | 5 | |
| 28 | Зернівка: за шириною | середня | 5 | |
| 29 | Зернівка: відношення довжина/ ширина | середнє | 5 | |
| 30 | Зернівка: за крупністю | крупна | 7 | |
| 31 | Язичок: виявлення | короткий | 3 | |
| 32 | Нижня квітова луска: кіль | відсутній | 1 | |
| 33 | Вушка: за формою | гострі | 2 | |
| 34 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | слабке | 3 | |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) | ланцетна | 4 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,19 | 6,69 | 5,99 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 5,03 | 6,67 | 5,53 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | -0,16 | -0,02 | -0,46 |
| +, - до усередненої урожайності, % | -3 | -0,3 | -7,6 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Тривалість періоду вегетації, дів | 262 | 262 | 273 |
| Висота рослини, см | 91,1 | 95,3 | 100,9 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г | 39,5 | 42,7 | 38,8 |
| Вміст білка, % | 14,4 | 13,9 | 14,1 |
| Вміст сирової клейковини, % | 28,7 | 27,9 | 28,3 |
| Сила борошна (W), о.а. | 260 | 279 | 287 |
| Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл | 900 | 930 | 990 |
| Стійкість до вилягання, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість до обсіпання, бал | 8 | 9 | 8 |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 7 | 6 |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал | 7 | 6 | 5 |
| Стійкість проти бурі іржі, бал | 7 | 8 | 6 |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал | 9 | 7 | 5 |
| Стійкість проти мухи шведської, бал | 8 | 9 | 8 |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал | 9 | 8 | 9 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 8 | 9 | 8 |
| Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал | | 6,5 | |
| Блок | 1 | 1 | 1 |
| Напрямок використання | цїн | цїн | слн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.