

**Вид:** Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

**Заявка № 18023006 Назва сорту:** Остінато **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 29.10.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210838**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший fertильний вузол включно)	середня	5	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочек: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочек: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочек: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочек: положення найширошої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочек: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	вузький	3	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	середня	5	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насініна: форма	еліптична	1	
49	Насініна: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насініна: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насініна: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насініна: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насініна: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насініна: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насініна: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насініна: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насініна: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,29	2,72	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,77	2,72	
+ - до усередненої урожайності, т/га	-0,52	0	
+ - до усередненої урожайності, %	-15,8	0	
Довірчий інтервал, т/га	0,42	0,25	
Тривалість періоду вегетації, діб	84	84	
Висота рослини, см	68,7	80,6	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 14%), г	188,4	202,7	
Придатність до механізованого збирання, бал	7	8	
Висота прикреплення нижнього бобу, см	40	56,7	
Стійкість до вилагання, бал	7	6	
Стійкість до обсипання, бал	7	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	
Стійкість проти гнилей кореневих, бал	9	8	
Стійкість проти аскохітозу (боби, зерно), бал	8	8	
Стійкість проти антракнозу, бал	8	8	
Вміст білка, %	24,2	24,3	
Блок	4	4	
Напрям використання	зерн	зерн	
Якість	сбіл	сбіл	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.**