

**Вид:** Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 19088005 Назва сорту:** Наталія**Заявник (код):** 1508 **Власник сорту (код):** 1508**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 29.10.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210845****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Світловий паросток: розмір  | середній                 | 5   |          |
| 2  | Світловий паросток: форма   | сферична                 | 1   |          |
| 3  | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи                                      | слабка                   | 3   |          |
| 4  | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи                        | відсутнє або дуже мале   | 1   |          |
| 5  | Світловий паросток: опушенння основи  | слабке                   | 3   |          |
| 6  | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою   | середня                  | 5   |          |
| 7  | Світловий паросток: форма верхівки  | проміжна                 | 3   |          |
| 8  | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки  | слабке                   | 3   |          |
| 9  | Світловий паросток: опушенння верхівки  | помірне                  | 5   |          |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків  | мало                     | 3   |          |
| 11 | Світловий паросток: бічні пагони за довжиною  | короткі                  | 3   |          |
| 12 | Рослина: тип розвитку   | проміжний                | 2   |          |
| 13 | Рослина: габітус  | прямий                   | 3   |          |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення   | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 15 | Листок: загальний розмір  | середній                 | 5   |          |
| 16 | Листок: за відкритістю  | проміжний                | 3   |          |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків   | слабке                   | 3   |          |
| 18 | Листок: зелене забарвлення  | світле                   | 3   |          |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці                                     | слабке                   | 3   |          |
| 20 | Друга пара бічних листочків: розмір   | дуже великий             | 9   |          |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за ширину  | середні                  | 5   |          |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення   | часто                    | 7   |          |
| 23 | Листочек: хвилястість краю  | слабка                   | 3   |          |
| 24 | Листочек: загиблення жилок  | середнє                  | 5   |          |
| 25 | Листочек: глянсуватість верхнього боку  | помірно глянсуватий      | 5   |          |
| 26 | Листочек: опушенні пластинки на верхівці розетки  | наявне                   | 9   |          |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення  | середнє                  | 5   |          |
| 28 | Рослина: за висотою   | висока                   | 7   |          |
| 29 | Рослина: рясність цвітіння  | обрідне                  | 3   |          |
| 30 | Суцвіття: розмір  | малий                    | 3   |          |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки   | слабке                   | 3   |          |
| 32 | Віночок квітки: розмір  | малий                    | 3   |          |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку                               | помірна                  | 5   |          |
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку                 | відсутнє або мале        | 1   |          |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці                                       | середнє                  | 5   |          |
| 36 | Рослина: час достигання   | дуже ранній              | 1   |          |
| 37 | Бульба: форма   | овальна                  | 3   |          |
| 38 | Бульба: вічка за глибиною   | мілкі                    | 3   |          |
| 39 | Бульба: забарвлення шкірки  | жовте                    | 2   |          |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічка  | жовте                    | 2   |          |
| 41 | Бульба: забарвлення м'якоті   | кремове                  | 2   |          |
| 42 | Лиші сорти із світло-бежевою і жовою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | сильне                   | 7   |          |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник  | Значення |       |   |
|---|----------|-------|---|
|   | С        | Л     | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 23,38    | 19,14 |   |
| урожайність, т/га   | 24,58    | 20,73 |   |
| + - до усередненої урожайності, т/га  | 1,2      | 1,59  |   |
| + - до усередненої урожайності, %   | 5,1      | 8,3   |   |
| Довірчий інтервал, т/га   | 3,44     | 2,41  |   |
| Тривалість періоду вегетації, діб   | 77       | 71    |   |
| Середня маса товарної бульби, г   | 86       | 101,6 |   |
| Вміст крохмалю, %   | 13       | 12,3  |   |
| Збір крохмалю, т/га   | 3,2      | 2,5   |   |
| Вміст сухої речовини, %   | 20,9     | 20    |   |
| Дегустаційна оцінка, бал  | 6        | 5     |   |
| Придатність до механізованого збирання, бал   | 9        | 9     |   |
| Лежкість, бал   | 7        | 9     |   |
| Товарність бульб, %   | 78,7     | 91,7  |   |
| Стикість проти макроспоріозу, бал   | 8        | 9     |   |
| Стикість проти фітофторозу, бал   | 7        | 4     |   |
| Стикість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал                         | 9        | 9     |   |
| Блок (Група стигlosti)  | 6        | 6     |   |
| Напрям використання   | СТЛ      | СТЛ   |   |
| Якість  | СК       | НК    |   |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**