

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 19040063 Назва сорту: Діпло **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.10.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210769

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	до середніх
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до середніх
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	до середньої
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	до довгої
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	дуже сильна	9	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,47	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,7	3,2	3,04
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,63	-0,27	0,56
+, - до усередненої урожайності, %	30,1	-7,9	22,4
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	289	291	315
Висота рослини, см	102,4	110,4	127,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,7	5,3	4,9
Вміст білка, %	20,4	19,2	18,9
Вміст олії, %	45,5	46,5	46,5
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,8	0,8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	8	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	5
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	8	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.