

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088012 Назва сорту: Партнер Заявник (код): 2093 Власник сорту (код): 2093

Дата пріоритету: 29.01.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.10.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210846

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака   | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|--|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Світловий паросток: розмір   | великий                  | 7   |          |
| 2  | Світловий паросток: форма  | конічна                  | 3   |          |
| 3  | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи                                       | помірна                  | 5   |          |
| 4  | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи                         | відсутнє або дуже мале   | 1   |          |
| 5  | Світловий паросток: опушення основи  | слабке                   | 3   |          |
| 6  | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою  | велика                   | 7   |          |
| 7  | Світловий паросток: форма верхівки   | відкрита                 | 5   |          |
| 8  | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки   | слабке                   | 3   |          |
| 9  | Світловий паросток: опушення верхівки  | помірне                  | 5   |          |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків   | мало                     | 3   |          |
| 11 | Світловий паросток: бічні пагони за довжиною   | короткі                  | 3   |          |
| 12 | Рослина: тип розвитку  | листяковий               | 3   |          |
| 13 | Рослина: габітус   | напіврозлогий            | 5   |          |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення  | помірне                  | 5   |          |
| 15 | Листок: загальний розмір   | малий                    | 3   |          |
| 16 | Листок: за відкритістю   | проміжний                | 3   |          |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків  | слабке                   | 3   |          |
| 18 | Листок: зелене забарвлення   | помірне                  | 5   |          |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці                                      | слабке                   | 3   |          |
| 20 | Друга пара бічних листочків: розмір  | дуже великий             | 9   |          |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за шириною  | середні                  | 5   |          |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення  | відсутні або дуже рідко  | 1   |          |
| 23 | Листочок: хвилястість краю   | слабка                   | 3   |          |
| 24 | Листочок: заглиблення жилок  | середнє                  | 5   |          |
| 25 | Листочок: глянуватість верхнього боку  | помірно глянуватий       | 5   |          |
| 26 | Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки   | наявне                   | 9   |          |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення   | середнє                  | 5   |          |
| 28 | Рослина: за висотою  | середня                  | 5   |          |
| 29 | Рослина: рясність цвітіння   | рясне                    | 7   |          |
| 30 | Суцвіття: розмір   | середній                 | 5   |          |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки  | слабке                   | 3   |          |
| 32 | Віночок квітки: розмір   | середній                 | 5   |          |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку                                | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку                  | відсутнє або мале        | 1   |          |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці  | відсутнє або дуже мале   | 1   |          |
| 36 | Рослина: час досягання   | середній                 | 5   |          |
| 37 | Бульба: форма  | короткоовальна           | 2   |          |
| 38 | Бульба: вічка за глибиною  | глибокі                  | 7   |          |
| 39 | Бульба: забарвлення шкірки   | жовте                    | 2   |          |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічка   | жовте                    | 2   |          |
| 41 | Бульба: забарвлення м'якоті  | біле                     | 1   |          |
| 42 | Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | дуже сильне              | 9   |          |

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник  | Значення |       |       |
|---|----------|-------|-------|
|   | С        | Л     | П     |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га |          | 22,72 | 19,92 |
| Урожайність, т/га   |          | 24,16 | 17,12 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га   |          | 1,44  | -2,8  |
| +, - до усередненої урожайності, %  |          | 6,3   | -14   |
| Довірчий інтервал, т/га   |          | 1,17  | 0,9   |
| Тривалість періоду вегетації, діб   |          | 109   | 90    |
| Середня маса товарної бульби, г   |          | 66,4  | 62,2  |
| Вміст крохмалю, %   |          | 20,8  | 18,3  |
| Збір крохмалю, т/га   |          | 5,03  | 3,13  |
| Вміст сухої речовини, %   |          | 30,6  | 27,2  |
| Дегустаційна оцінка, бал  |          | 6     | 6     |
| Придатність до механізованого збирання, бал   |          | 9     | 9     |
| Лежкість, бал   |          | 7     | 9     |
| Товарність бульб, %   |          | 73,4  | 65,9  |
| Стійкість проти макроспоріозу, бал  |          | 8     | 8     |
| Стійкість проти фітофторозу, бал  |          | 7     | 5     |
| Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал                        |          | 9     | 9     |
| Блок (група стиглості)  |          | 8     | 8     |
| Напрямок використання   |          | ТХН   | ТХН   |
| Якість  |          | ВК    | ПК    |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.