

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 19040056 Назва сорту: ЕС МОМЕНТО Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата пріоритету: 27.05.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.09.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210661

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	до середніх
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до середніх
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,47	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,5	2,73	2,63
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,43	-0,75	0,15
+ , - до усередненої урожайності, %	20,8	-21,6	5,9
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	289	292	315
Висота рослини, см	108	117,6	129,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,6	5,5	5,2
Вміст білка, %	21,3	20,1	19,4
Вміст олії, %	44,5	45,2	45,5
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,3	0
Вміст глюкостролатів, %	0,7	0,8	0,9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	7	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.