

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 18040054 Назва сорту: КВС КАЛІНДО КЛ Заявник (код): 2649 Власник сорту (код): 2649

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.10.2021 Патент № 210910

Дата пріоритету: 17.12.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.09.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210651

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	до довгого
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	до довгого
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	дуже сильна	9	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,47	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,47	2,63	2,7
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,4	-0,84	0,22
+, - до усередненої урожайності, %	19,2	-24,4	8,5
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	288	293	314
Висота рослини, см	111,8	120,2	132,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5,8	5,2
Вміст білка, %	21,6	19,6	18,9
Вміст олії, %	44	45,8	45,8
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	6	8	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	6	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	7	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.