

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 19040022 Назва сорту: КОЛУМБІЯ **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.09.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210659

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	до довгого
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	до довгого
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3	до середньої
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	до сильної
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,47	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,04	3,06	2,93
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,97	-0,41	0,44
+, - до усередненої урожайності, %	46,7	-11,9	17,7
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	290	293	316
Висота рослини, см	111,6	110,8	122,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	5	6	5,6
Вміст білка, %	21,9	19,8	19,4
Вміст олії, %	44	45,4	45,3
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	8
Стійкість до посухи, бал	8	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	8	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.