

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка № 18155001 Назва сорту: Каллісто **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.10.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210850

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	різнокольорове	3	
2	Плоїдність	ознака не визначалась	0	
3	Сім'ядолі: за довжиною	ознака не визначалась	0	
4	Сім'ядолі: за шириною	ознака не визначалась	0	
5	Рослина: за висотою у рік сівби	середня	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	помірна	5	
7	Рослина: габітус восени у рік сівби	проміжний	5	
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	помірна	5	
9	Рослина: за висотою навесні	низька	3	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	помірна	5	
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
12	Стебло: за довжиною	середнє	5	
13	Стебло: за товщиною	середнє	5	
14	Стебло: кількість міжвузлів	мала	3	
15	Стебло: щільність опушення	нещільна	3	
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1	
17	Листок: центральний листочок за довжиною	середній	5	
18	Листок: центральний листочок за шириною	середній	5	
19	Листок: частота наявності білих міток	середня	5	
20	Рослина: за природною висотою другого укосу	середня	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,63	5,79
Урожайність сухої речовини, т/га		6,62	6,28
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,99	0,49
+, - до усередненої урожайності, т/га		17,5	8,4
Довірчий інтервал, т/га		1,75	1,56
Тривалість періоду вегетації, днів		124	101
Залистяність, %		46,8	41,6
Вміст білка (сирого протеїну), %		19,4	19
Стійкість до вилягання, бал		8	8
Стійкість до посухи, бал		8	8
Стійкість проти антракнозу, бал		9	8
Стійкість проти стеблової іржі, бал		8	8
Стійкість проти бурої плямистості, бал		8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал		9	8
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал		9	8
Зимостійкість, бал		7	8
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га		1,7	1,9
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.