

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.**Заявка № 20113011 Назва сорту:** Салазар **Заявник (код):** 2752 **Власник сорту (код):** 2752**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.10.2021 **Патент № 210878****Дата пріоритету:** 17.12.2020**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.10.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210743****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже сильна	9	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	низька	3	
11	Листок: пластина за довжиною	довга	7	
12	Листок: пластина за ширину	широка	7	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвильастість краю	помірна	5	
16	Листок: пухирчастість	слабка	3	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глянсуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівлонікли	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення піляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед досягненням)	зелене	3	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досягненням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	короткий	3	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2	
30	Плід: хвильастість перикарпію в базальній частині	слабка	3	
31	Плід: хвильастість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувана	1	
33	Плід: забарвлення (за досягнення)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягнення)	помірна	5	
35	Плід: глянсуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	три-четири	4	
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необротаюча	1	
45	Плід: капсіцин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час досягнення	ранній	3	
48,1	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 0 (<i>Tobacco Mosaic Virus (0)</i>)	наявна	9	
48,2	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2 (<i>Tomato Mosaic Virus (1-2)</i>)	відсутня	1	
48,3	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2-3 (<i>Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)</i>)	відсутня	1	
49,1	Стійкість проти <i>Potato Virus Y (PVY)</i> : Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
49,2	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Rhynchosciara capsici</i>	відсутня	1	
51	Стійкість проти <i>Cucumber Mosaic Virus (CMV)</i>	відсутня	1	
52	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)</i>	наявна	9	
53	Стійкість проти <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Vesicatoria</i>	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 27. Тривалість періоду до досягнення, діб – 75. Товщина стінки плоду, мм – 6. Середня маса плоду, г – 200. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 127; загального цукру, % – 3,9; клітковини, % – 2,2; сухої речовини, % – 6,3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.