

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

Заявка № 18118004 Назва сорту: Гіганте сікуло **Заявник (код):** 2591 **Власник сорту (код):** 2591

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.10.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210869

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|--|-----|----------|
| 1 | Плоїдність | диплоїд | 2 | |
| 2 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила | наявне | 9 | |
| 3 | Сім`ядолі: розмір | середній | 5 | |
| 4 | Листкова розетка: за шириною основи | широка | 7 | |
| 5 | Листок: положення у просторі | напівпряме | 3 | |
| 6 | Листок: за довжиною | довгий | 7 | |
| 7 | Листкова пластинка: форма | оберненойцеподібна | 3 | |
| 8 | Листкова пластинка: форма верхівки | округла | 2 | |
| 9 | Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення | сіруватий | 3 | |
| 10 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | сильна | 7 | |
| 11 | Листкова пластинка: кількість лопатей | велика | 7 | |
| 12 | Листкова пластинка: надрізи краю | наявні | 9 | |
| 13 | Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною | неглибокі | 3 | |
| 14 | Листкова пластинка: опушення | слабке | 3 | |
| 15 | Черешок: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 16 | Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірна | 5 | |
| 17 | Коренеплід: діаметр | великий | 7 | |
| 18 | Коренеплід: головний корінь за шириною | середній | 5 | |
| 19 | Коренеплід: форма | округла | 2 | |
| 20 | Коренеплід: форма верхівки | плеската | 2 | |
| 21 | Коренеплід: форма основи | округла | 4 | |
| 22 | Коренеплід: забарвлення шкірки | однокольорове | 1 | |
| 23 | Коренеплід: забарвлення верхньої частини | червоне | 3 | |
| 24 | Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині | яскраво-червоне (забарвлення кіноварі) | 1 | |
| 25 | Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки | ознака не визначається | 0 | |
| 26 | Коренеплід: кора за товщиною | тонка | 3 | |
| 27 | Коренеплід: основне забарвлення м'якоті | матове біле | 2 | |
| 28 | Час достигання | ранній | 3 | |
| 29 | Коренеплід: здатність до утворення дулла | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 30 | Коренеплід: за довжиною | кородкий | 3 | |
| 31 | Коренеплід: форма плеча | плеската | 1 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 25. Тривалість періоду до достигання, діб – 40. Середня маса плоду, г – 27. Вміст сухої речовини, % – 4,5; вітаміну С, мг/% – 18.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С, 3Гр.