

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 14088004 Назва сорту: Кріспер **Заявник (код):** 1858 **Власник сорту (код):** 1858

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.01.2018 **Патент № 180089**

Дата пріоритету: 04.04.2014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	малий	3
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1
23	Листочок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
24	Листочок: заглиблення жилок	мілке	3
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	ранній	3
37	Бульба: форма	короткоовальна	2
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	відсутнє або дуже слабке	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		216,4	185,9
Вміст крохмалю, %		16,8	17,4
Збір крохмалю, ц/га		36,4	32,3
Вміст сухої речовини, %		25,4	26,0
Тривалість періоду вегетації, днів		102	104
Середня маса товарної бульби, г		94,9	83,3
Дегустаційна оцінка, бал		7	7
Товарність бульб, %		58,5	79,5
Напрямок використання		стл	стл
Лежкість, бал		7	-
Стійкість до пошкодження нематою, бал		9	9
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку		Стійкий	Стійкий
Стійкість проти макроспоріозу, бал		9	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		9	9
Якість		пкр	пкр

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.