

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009193 Назва сорту: РЖТ АЛІККС Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2021 Патент № 211014

Дата пріоритету: 06.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211162

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|------|--|----------------------------|-----|------------------------|
| 1 | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви | сильне | 7 | |
| 2 | Перший листок: форма верхівки | округла | 3 | |
| 3 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 2 | |
| 4 | Листок: хвилястість краю пластинки | помірна | 2 | |
| 5 | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом | середній | 5 | |
| 6 | Листок: положення пластинки у просторі | ледь похиле | 3 | |
| 7 | Стебло: зигзагоподібність | слабка | 2 | |
| 8 | Волость: час цвітіння | від раннього до середнього | 4 | |
| 9 | Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 10 | Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи | слабке | 3 | |
| 11 | Волость: антоціанове забарвлення пиляків | слабке | 3 | |
| 12 | Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками | середній | 5 | до великого |
| 13 | Волость: положення бічних гілочок у просторі | пряме | 1 | до ледь похилого |
| 14 | Волость: кількість первинних бічних гілочок | відсутні або дуже мала | 1 | до малої кількості |
| 15 | Качан: час появи шовку | від раннього до середнього | 4 | |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення шовку | помірне | 5 | |
| 17 | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів | помірне | 5 | |
| 18 | Волость: розташування колосків за щільністю | середньої щільності | 5 | |
| 19 | Листок: антоціанове забарвлення піхви | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 20 | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів | відсутнє або дуже слабке | 1 | до слабкого |
| 21 | Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) | середня | 5 | |
| 22 | Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) | середня | 5 | |
| 23 | Волость: бічна гілочка за довжиною | середня | 5 | |
| 24,1 | Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною | довга | 7 | |
| 25 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини | мале | 3 | до середнього |
| 26 | Листок: пластинка за шириною | середня | 5 | |
| 27 | Качан: ніжка за довжиною | коротка | 3 | до середньої |
| 28 | Качан: за довжиною | середній | 5 | |
| 29 | Качан: діаметр (посередині) | великий | 7 | |
| 30 | Качан: форма | конусно-циліндрична | 2 | |
| 31 | Качан: кількість зернових рядів | мала | 3 | до середньої кількості |
| 32 | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен | ознака не визначається | 0 | |
| 33 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору | ознака не визначається | 0 | |
| 34 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 35 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною | ознака не визначається | 0 | |
| 36 | Качан: тип зернівки | зубовидноподібний | 4 | |
| 37 | Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок | ознака не визначається | 0 | |
| 38 | Качан: забарвлення верхівки зернівки | жовте | 3 | |
| 39 | За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок | жовто-оранжеве | 4 | |
| 40 | Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення | ознака не визначається | 0 | |
| 41 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня | слабке | 3 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 4,74 | 7,44 | 6,99 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 5,17 | 8,2 | 8,05 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | 0,43 | 0,76 | 1,06 |
| +, - до усередненої урожайності, % | 9,1 | 10,2 | 15,2 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,17 | 0,15 | 0,18 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 105 | 105 | 109 |
| Висота рослини, см | 217 | 255,3 | 242,5 |
| Вихід зерна, % | 81,7 | 83,2 | 83,3 |
| Висота прикріплення качана, см | 104,3 | 92,3 | 101,5 |
| Відсоток рослин з пониклими качанами, % | 61 | 16,5 | 0,5 |
| Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см | 7,1 | 3,7 | 5,2 |
| Вміст білка, % | 10,1 | 8,4 | 9,4 |
| Вміст крохмалю, % | 72,3 | 72,8 | 72,4 |
| Стійкість до посухи, бал | 6 | 9 | 9 |
| Стійкість до вилягання, бал | 8 | 9 | 9 |
| Стійкість проти пухирчастої сажки, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти стеблової гнилі, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал | 8 | 8 | 7 |
| Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал | 9 | 9 | 8 |
| Група стиглості (FAO) | 1 | 1 | 1 |
| Напрямок використання | | зерн | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.