

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 19045003 Назва сорту: Абака Заявник (код): 1498 Власник сорту (код): 1498

Дата пріоритету: 12.11.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211072

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного напівпрямий	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	рудувато-коричневе	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	середня	5	
6	Рослина: за висотою	слабка	3	
7	Листок: пухирчастість	загостренояцеподібна	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	середній	5	
9	Листок: розмір бічного листочка	помірна	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	фіолетове	2	
11	Квітка: забарвлення	помірна	5	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	середній	5	
13	Насінина: розмір	округло-видовжена	5	
14	Насінина: форма	жовте	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	ознака не визначена	0	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	жовте	2	
17	Насінина: забарвлення рубчика	як у насінній оболонці	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	від дуже раннього до раннього	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання			

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,64	2,99	2,77
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,61	3,69	3,82
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,97	0,7	1,05
+, - до усередненої урожайності, %	59,1	23,3	37,7
Довірчий інтервал, т/га	0,11	0,11	0,12
Тривалість періоду вегетації, днів	101	109	114
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	162,4	194	183,7
Висота рослини, см	70,8	79,7	83,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	14,8	11,5	14,4
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	38,4	41,8	36,3
Вміст олії, %	22,9	20,4	22,9
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.