

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045001 Назва сорту: Аврел Заявник (код): 807 Власник сорту (код): 807

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211077

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	майже чорне	5	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насінневі оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,64	2,99	2,77
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,62	3,23	3,38
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,98	0,24	0,61
+, - до усередненої урожайності, %	59,8	8,1	22,2
Довірчий інтервал, т/га	0,11	0,11	0,12
Тривалість періоду вегетації, діб	101	120	119
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	170,9	195,6	176,6
Висота рослини, см	68	89,5	86,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,5	12,8	11,9
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	37,2	41,1	37,1
Вміст олії, %	22,3	20,3	21,7
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.