

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 19045004 Назва сорту: Ахілеа Заявник (код): 1498 Власник сорту (код): 1498

Дата пріоритету: 12.11.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211309

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,71	3,07	
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,35	4,38	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	1,31	
+, - до усередненої урожайності, %	37,6	42,6	
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	
Тривалість періоду вегетації, дб	119	121	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	157,3	194,9	
Висота рослини, см	63,7	77,5	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,7	9,8	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Вміст білка, %	40,2	41,4	
Вміст олії, %	22,1	20,8	
Блок (група стиглості)	7	7	
Напрямок використання	зерн	зерн	
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.