

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045035 Назва сорту: Елада **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.12.2021 **Патент № 211114**

Дата пріоритету: 21.11.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211308

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	сильна	7	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,48	3,22	2,9
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,2	0,93	1,02
+, - до усередненої урожайності, %	-12,2	40,5	54,1
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	106	106	112
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	147,4	205,7	187,1
Висота рослини, см	57,9	71,5	90
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,3	13,3	15,5
Дружність досягання, бал	8	7	8
Кількість бобів на рослині, шт	7	8	8
Кількість зерен у бобі, шт	7	7	8
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	37,1	40,4	35,8
Стійкість проти септоріозу, бал	23,2	21,4	23
Стійкість проти фузаріозу, бал	6	6	6
Вміст білка, %	зерн	зерн	зерн
Вміст олії, %	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.