

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 19045032 Назва сорту: ЕС ІНСТРУКТОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата пріоритету: 06.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211315

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного напівпрямий	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	рудувато-коричневе	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	від середньої до високої	6	
6	Рослина: за висотою	помірна	5	
7	Листок: пухирчастість	загостренояцеподібна	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	великий	7	
9	Листок: розмір бічного листочка	помірна	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	фіолетове	2	
11	Квітка: забарвлення	помірна	5	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	середній	5	
13	Насінина: розмір	округло-видовжена	5	
14	Насінина: форма	жовте	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	ознака не визначена	0	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	темно-коричневе	4	
17	Насінина: забарвлення рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	від дуже раннього до раннього	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягання			

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,71	3,07	2,8
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,6	3,11	2,95
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,89	0,04	0,15
+, - до усередненої урожайності, %	51,8	1,4	5,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,11
Тривалість періоду вегетації, днів	111	115	126
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	147,7	178,9	154,8
Висота рослини, см	81,8	104,2	99,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12	10,2	10,6
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	38,9	42,1	39
Вміст олії, %	22,5	20,2	21,1
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.