

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 19045027 Назва сорту:** ЕС КОНДУКТОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата пріоритету:** 06.12.2019

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 211310**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,71	3,07	2,8
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,61	3,47	3,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,9	0,4	0,35
+, - до усередненої урожайності, %	52,8	13,1	12,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	109	115	129
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	147,2	163,8	156,4
Висота рослини, см	78,5	91,8	97
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,2	13,3	13,6
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	38,6	40	39
Вміст олії, %	22,6	25,5	21,4
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.