

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 19045008 Назва сорту: П18А02 Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211075

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	сильна	7	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкоюяцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягання	від середнього до пізнього	6	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,71	3,07	2,8
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,79	3,56	3,34
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,08	0,49	0,54
+, - до усередненої урожайності, %	63,1	15,9	19,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	110	128	126
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	159,5	167,8	150,3
Висота рослини, см	75,2	85,8	91,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	13	15	17,9
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсипання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	36,9	40,2	37,5
Вміст олії, %	22,1	19,9	21,7
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.