

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 19045036 Назва сорту: РЖТ САТЕЛІЯ **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2021 **Патент № 211060**

Дата пріоритету: 06.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211319

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|-------------------------------|-----|----------|
| 1 | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | слабка | 3 | |
| 3 | Рослина: тип росту | напівдетермінантний | 2 | |
| 4 | Рослина: габітус (характер росту) | від прямого до напівпрямого | 2 | |
| 5 | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) | рудувато-коричневе | 2 | |
| 6 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 7 | Листок: пухирчастість | помірна | 5 | |
| 8 | Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка) | загостренояцеподібна | 3 | |
| 9 | Листок: розмір бічного листочка | середній | 5 | |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | слабка | 3 | |
| 11 | Квітка: забарвлення | фіолетове | 2 | |
| 12 | Біб: інтенсивність коричневого забарвлення | помірна | 5 | |
| 13 | Насінина: розмір | середній | 5 | |
| 14 | Насінина: форма | округло-видовжена | 5 | |
| 15 | Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) | жовте | 1 | |
| 16 | Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази | ознака не визначена | 0 | |
| 17 | Насінина: забарвлення рубчика | жовте | 2 | |
| 18 | Насінина: забарвлення сім'яної рубчика | як у насіннєвій оболонці | 1 | |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | від дуже раннього до раннього | 2 | |
| 20 | Рослина: час досягання | від раннього до середнього | 4 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|----------|----------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 1,64 | 2,99 | 2,77 |
| Урожайність (за стандартної вологості), т/га | 2,52 | 3,73 | 3,42 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | 0,88 | 0,74 | 0,65 |
| +, - до усередненої урожайності, % | 53,4 | 24,9 | 23,4 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 103 | 114 | 118 |
| Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г | 157,2 | 198,3 | 165,6 |
| Висота рослини, см | 73,3 | 91,7 | 92,5 |
| Висота прикріплення нижнього бобу, см | 11,5 | 13,8 | 13,5 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 8 | 8 |
| Стійкість до обсіпання, бал | 9 | 9 | 8 |
| Стійкість до посухи, бал | 8 | 8 | 9 |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість проти аскохітозу, бал | 9 | 8 | 8 |
| Стійкість проти бактеріозу, бал | 9 | 8 | 8 |
| Стійкість проти септоріозу, бал | 9 | 8 | 8 |
| Стійкість проти фузаріозу, бал | 8 | 9 | 8 |
| Вміст білка, % | 38,6 | 41,5 | 38,3 |
| Вміст олії, % | 23 | 21,2 | 22,6 |
| Блок (група стиглості) | 6 | 6 | 6 |
| Напрямок використання | зерн | зерн | зерн |
| Якість | сбіл, вл | сбіл, сл | сбіл, вл |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.