

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045007 Назва сорту: Терсія Заявник (код): 142 Власник сорту (код): 142

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.12.2021 Патент № 211115

Дата пріоритету: 22.01.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211078

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,71	3,07	2,8
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,55	3,24	3,64
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,84	0,17	0,84
+, - до усередненої урожайності, %	49	5,7	30,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,09	0,11
Тривалість періоду вегетації, днів	115	122	130
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	156,3	190,6	178,7
Висота рослини, см	72,7	86,8	87,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12	15,5	14,9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	38,7	41,7	39
Вміст олії, %	22,4	20	21,1
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.