

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera***Заявка № 19041006 Назва сорту:** Лагун **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912**Дата пріоритету:** 26.12.2019**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 211238****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Сорти тільки з частковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7	
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	довгі	7	
14	Квітка: ширина пелюсток	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7	
19	Стручок: довжина зубця	довгий	7	
20	Стручок: довжина ніжки	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,03	1,64	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,62	1,76	
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,58	0,12	
+/- до усередненої урожайності, %	28,6	7,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	
Тривалість періоду вегетації, діб	105	99	
Висота рослини, см	101,5	112,5	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,8	4,6	
Вміст білка, %	24	23,4	
Вміст олії, %	43,6	44,1	
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	7	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	9	9	
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	
Блок	1	1	
Напрям використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.