

**Вид:** Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка №** 19088003 **Назва сорту:** Медея **Заявник (код):** 1710 **Власник сорту (код):** 1710**Дата пріоритету:** 20.11.2019**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.12.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 211425**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення             | Код | Примітка |
|----|--|------------------------|-----|----------|
| 1  | Світловий паросток: розмір   | великий                | 7   |          |
| 2  | Світловий паросток: форма  | яйцеподібна            | 2   |          |
| 3  | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи                                       | помірна                | 5   |          |
| 4  | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи                         | відсутнє або дуже мале | 1   |          |
| 5  | Світловий паросток: опущення основи  | сильне                 | 7   |          |
| 6  | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою  | середня                | 5   |          |
| 7  | Світловий паросток: форма верхівки   | відкрита               | 5   |          |
| 8  | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки   | слабке                 | 3   |          |
| 9  | Світловий паросток: опущення верхівки  | помірне                | 5   |          |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків   | середня кількість      | 5   |          |
| 11 | Світловий паросток: бічні пагони за довжиною   | короткі                | 3   |          |
| 12 | Рослина: тип розвитку  | листковий              | 3   |          |
| 13 | Рослина: габітус   | напіврозлогий          | 5   |          |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення  | помірне                | 5   |          |
| 15 | Листок: загальний розмір   | середній               | 5   |          |
| 16 | Листок: за відкритістю   | проміжний              | 3   |          |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків  | помірне                | 5   |          |
| 18 | Листок: зелене забарвлення   | свіtle                 | 3   |          |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці                                      | слабке                 | 3   |          |
| 20 | Друга пара бічних листочків: розмір  | дуже великий           | 9   |          |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за шириною  | середні                | 5   |          |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення  | рідко                  | 3   |          |
| 23 | Листочек: хвильастість краю  | слабка                 | 3   |          |
| 24 | Листочек: заглиблення жилок  | середнє                | 5   |          |
| 25 | Листочек: глянсуватість верхнього боку   | помірно глянсуватий    | 5   |          |
| 26 | Листочек: опущення пластинки на верхівці розетки   | наявне                 | 9   |          |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення   | слабке                 | 3   |          |
| 28 | Рослина: за висотою  | середня                | 5   |          |
| 29 | Рослина: рясність цвітіння   | помірне                | 5   |          |
| 30 | Суцвіття: розмір   | середній               | 5   |          |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки  | слабке                 | 3   |          |
| 32 | Віночок квітки: розмір   | середній               | 5   |          |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку                                | слабка                 | 3   |          |
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку                  | відсутнє або мале      | 1   |          |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці  | середнє                | 5   |          |
| 36 | Рослина: час достигання  | середній               | 5   |          |
| 37 | Бульба: форма  | короткоovalна          | 2   |          |
| 38 | Бульба: вічка за глибиною  | середні                | 5   |          |
| 39 | Бульба: забарвлення шкірки   | жовте                  | 2   |          |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічка   | жовте                  | 2   |          |
| 41 | Бульба: забарвлення мякоті   | помірно жовте          | 4   |          |
| 42 | Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | сильне                 | 7   |          |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник  | Значення |       |   |
|---|----------|-------|---|
|   | C        | L     | P |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 22,72    | 19,92 |   |
| урожайність, т/га   | 25,55    | 23,16 |   |
| + - до усередненої урожайності, т/га  | 2,83     | 3,24  |   |
| + - до усередненої урожайності, %   | 12,5     | 16,2  |   |
| Довірчий інтервал, т/га   | 1,17     | 0,9   |   |
| Тривалість періоду вегетації, діб   | 112      | 89    |   |
| Середня маса товарної бульби, г   | 102,8    | 94    |   |
| Вміст крохмалю, %   | 14,3     | 12,7  |   |
| Збір крохмалю, т/га   | 3,65     | 2,94  |   |
| Вміст сухої речовини, %   | 22,7     | 20,5  |   |
| Дегустаційна оцінка, бал  | 6        | 5     |   |
| Придатність до механізованого збирання, бал   | 8        | 9     |   |
| Лежкість, бал   | 7        | 9     |   |
| Товарність бульб, %   | 81,4     | 91    |   |
| Стійкість проти макроспоріозу, бал  | 8        | 8     |   |
| Стійкість проти фітофторозу, бал  | 8        | 6     |   |
| Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 – нестійкий, 9 – стійкий, бал                        | 9        | 9     |   |
| Блок (Група стиглості)  | 8        | 8     |   |
| Напрям використання   | СТП      | СТП   |   |
| Якість  | СК       | НК    |   |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**