

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 21093002 Назва сорту: Октавія **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.12.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211084

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія | наявне | 9 | |
| 2 | Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилія | помірне | 5 | |
| 3 | Рослина: габітус | прямостоячий | 1 | |
| 4 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 5 | Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки) | середнє | 5 | |
| 6 | Стебло: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 7 | Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірна | 5 | |
| 8 | Стебло: опушення | помірне | 5 | |
| 9 | Листкова пластинка: розмір | середній | 5 | |
| 10 | Листкова пластинка: хвилястість краю | помірна | 5 | |
| 11 | Листкова пластинка: пухирчастість | помірна | 5 | |
| 12 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 13 | Суцвіття: кількість квіток | від одної до трьох | 1 | |
| 14 | Квітка: розмір | середній | 5 | |
| 15 | Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення | помірна | 5 | |
| 16 | Плід: за довжиною | середній | 5 | |
| 17 | Плід: максимальний діаметр | середній | 5 | |
| 18 | Плід: відношення довжина / діаметр | середнє | 5 | |
| 19 | Плід: основна форма | булавоподібна | 5 | |
| 20 | Плід: розмір рубця маточки | малий | 3 | |
| 21 | Плід: верхівка | округла | 3 | |
| 22 | Плід: витка рубця прийомки маточки за глибиною | відсутня або дуже мілка | 1 | |
| 23 | Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин | ознака не визначається | 0 | |
| 24 | Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості | фіолетове | 3 | |
| 25 | Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24) | сильна | 7 | |
| 26 | Плід: глясуватість (як для 24) | сильна | 7 | |
| 27 | Плід: плямистість | відсутня | 1 | |
| 28 | Плід: смугастість | відсутня | 1 | |
| 29 | Плід: помітність смуг | ознака не визначається | 0 | |
| 30 | Плід: щільність смуг | ознака не визначається | 0 | |
| 31 | Плід: ребристість | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 32 | Плід: квітконіжка за довжиною | середня | 5 | |
| 33 | Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою | наявне | 9 | |
| 34 | Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою | сильна | 7 | |
| 35 | Плід: розмір чашечки | середній | 5 | |
| 36 | Плід: антоціанове забарвлення чашечки | відсутнє | 1 | |
| 37 | Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки | ознака не визначається | 0 | |
| 38 | Плід: шипуватість чашечки | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 39 | Плід: зморшкуватість чашечки | помірна | 5 | |
| 40 | Плід: забарвлення м'якоті | зеленувате | 2 | |
| 41 | Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості | коричневе | 4 | |
| 42 | Час початку цвітіння | середній | 5 | |
| 43 | Час фізіологічної стиглості | ранній | 3 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 65. Період від сівби до початку достигання, діб – 72. Період плодоношення, діб – 70. Вміст сухої речовини в плодах, % – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.