

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov**Заявка № 18148003 Назва сорту:** PATRICIA**Заявник (код):** 1959**Власник сорту (код):** 1959**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.12.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 211097****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галуження	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галуження	дуже слабкий	1	до слабкого
7	Лиш кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	ознака не визначається	0	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
10	Стебло: крапчастість	наявна	9	
11	Стебло: вусики	добре розвинені	2	
12	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	мала	3	до середньої
17	Черешок: за довжиною	короткий	3	до середнього
18	Черешок: кількість шипів	середня	5	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільца всередині віночка	жовте і зелене	3	
21	Лиш сорти з зеленим забарвленням кільца всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
22	Чоловічка квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловічка квітка: забарвлення кільца всередині віночка	жовте і зелене	3	
24	Лиш сорти з зеленим забарвленням кільца всередині віночка. Чоловічка квітка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
25	Лиш сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	середнє	5	
26	Лиш сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	конічно-еліптична	3	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або борізок)	зелене	4	
28	Лиш сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лиш сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	слабка	3	
30	Плід: переважаюча форма	грушоподібна	10	
31,1	Лиш сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лиш сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лиш сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лиш сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5	
32,1	Лиш сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лиш сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лиш сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5	до великого
33,1	Лиш сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лиш сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лиш сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	має	3	до середнього
34,1	Лиш сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лиш сорти типу Rondin. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лиш сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лиш сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лиш сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лиш сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лиш сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лиш сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лиш сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лиш сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лиш сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лиш сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лиш сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	округлий	1	
46	Плід: борізди	відсутні	1	
47	Плід: борізди за глибину	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабкий	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	зелене	4	
51	Лиш сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лиш сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	дуже слабка	1	
53	Лиш сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Плід: смужки на боріздах	ознака не визначається	0	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздах	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	наявна	9	
58	Плід: розмір основних плям	середній	5	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірі	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірі	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	помірна	5	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	кремове	3	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	кремове	2	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	наявний	9	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	помірний	5	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1	
77	Насініна: розмір	середній	5	
78	Насініна: форма	еліптична	5	
79	Насініна: лушпиння	наявне	9	
80	Насініна: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насініна: забарвлення	білувате	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 78. Період від масових сходів до настання технічної стигlosti, діб – 125. Товарність, % – 100. Вміст сухої речовини, % – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 7; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 1; фузаріозне в'янення (*Fusarium niveum* E.Sm.) – 1; вірусні хвороби – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.