

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov

Заявка № 18148002 Назва сорту: ТЕРЕНУМ Заявник (код): 1902 Власник сорту (код): 1902

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210963

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №    | Ознака                                                                                                         | Проявлення                          | Код | Примітка |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|
| 1    | Паросток: форма сім'ядолей                                                                                     | вузькоеліптична                     | 1   |          |
| 2    | Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей                                                        | слабка                              | 3   |          |
| 3    | Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі                                                                 | пряма                               | 2   |          |
| 4    | Рослина: габітус                                                                                               | кущовий                             | 1   |          |
| 5    | Рослина: галуження                                                                                             | відсутнє                            | 1   |          |
| 6    | Рослина: ступінь галуження                                                                                     | ознака не визначається              | 0   |          |
| 7    | Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)                        | від напівпрямого до горизонтального | 4   |          |
| 8    | Стебло: забарвлення                                                                                            | цілком зелене                       | 1   |          |
| 9    | Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення                                                                     | помірна                             | 5   |          |
| 10   | Стебло: крапчастість                                                                                           | відсутня                            | 1   |          |
| 11   | Стебло: вусики                                                                                                 | відсутні або рудиментарні           | 1   |          |
| 12   | Листкова пластинка: розмір                                                                                     | великий                             | 7   |          |
| 13   | Листкова пластинка: розсіченість                                                                               | глибока                             | 7   |          |
| 14   | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку                                          | сильна                              | 7   |          |
| 15   | Листкова пластинка: срібляста плямистість                                                                      | наявна                              | 9   |          |
| 16   | Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю                                                  | мала                                | 3   |          |
| 17   | Черешок: за довжиною                                                                                           | довгий                              | 7   |          |
| 18   | Черешок: кількість шипів                                                                                       | середня                             | 5   |          |
| 19   | Жіноча квітка: кільце всередині віночка                                                                        | наявне                              | 9   |          |
| 20   | Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка                                                            | жовте                               | 1   |          |
| 21   | Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення           | помірна                             | 5   |          |
| 22   | Чоловіча квітка: кільце всередині віночка                                                                      | наявне                              | 9   |          |
| 23   | Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка                                                          | жовте і зелене                      | 3   |          |
| 24   | Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення         | помірна                             | 5   |          |
| 25   | Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра                             | мале                                | 3   |          |
| 26   | Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма                                    | циліндрична                         | 5   |          |
| 27   | Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)                          | частково біле і частково зелене     | 6   |          |
| 28   | Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)    | ознака не визначається              | 0   |          |
| 29   | Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27) | помірна                             | 5   |          |
| 30   | Плід: переважаюча форма                                                                                        | циліндрична                         | 9   |          |
| 31,1 | Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною                                                                     | ознака не визначається              | 0   |          |
| 31,2 | Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною                                                                      | ознака не визначається              | 0   |          |
| 31,3 | Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною                                                                    | ознака не визначається              | 0   |          |
| 31,4 | Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною                                                                      | середній                            | 5   |          |
| 32,1 | Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр                                                            | ознака не визначається              | 0   |          |
| 32,2 | Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр                                                             | ознака не визначається              | 0   |          |
| 32,3 | Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр                                                             | середній                            | 5   |          |
| 33,1 | Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра                                      | ознака не визначається              | 0   |          |
| 33,2 | Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра                                       | ознака не визначається              | 0   |          |
| 33,3 | Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра                                       | дуже мале                           | 1   |          |
| 34,1 | Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір                                                                           | ознака не визначається              | 0   |          |
| 34,2 | Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір                                                                          | ознака не визначається              | 0   |          |
| 35   | Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки                                                     | ознака не визначається              | 0   |          |
| 36   | Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю                                                  | ознака не визначається              | 0   |          |
| 37   | Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю                                        | ознака не визначається              | 0   |          |
| 38   | Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки                                                                | ознака не визначається              | 0   |          |
| 39   | Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки                                                                  | ознака не визначається              | 0   |          |
| 40   | Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра                                                   | ознака не визначається              | 0   |          |
| 41   | Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки                                                                 | ознака не визначається              | 0   |          |
| 42   | Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною                                                              | ознака не визначається              | 0   |          |
| 43   | Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра                              | ознака не визначається              | 0   |          |
| 44   | Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки                                                              | ознака не визначається              | 0   |          |
| 45   | Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець                                                     | округлий                            | 1   |          |
| 46   | Плід: боріздки                                                                                                 | відсутні                            | 1   |          |
| 47   | Плід: боріздки за глибиною                                                                                     | ознака не визначається              | 0   |          |
| 48   | Плід: ребра                                                                                                    | відсутні                            | 1   |          |
| 49   | Плід: ступінь виявлення ребер                                                                                  | ознака не визначається              | 0   |          |
| 50   | Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)                      | біле                                | 1   |          |
| 51   | Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)            | ознака не визначається              | 0   |          |
| 52   | Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)          | ознака не визначається              | 0   |          |
| 53   | Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення                        | ознака не визначається              | 0   |          |

| №  | Ознака                                                                                              | Проявлення             | Код | Примітка |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|
| 54 | Плід: смужки на боріздках                                                                           | ознака не визначається | 0   |          |
| 55 | Плід: забарвлення смужок на боріздках                                                               | ознака не визначається | 0   |          |
| 56 | Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)                     | ознака не визначається | 0   |          |
| 57 | Плід: плямистість                                                                                   | наявна                 | 9   |          |
| 58 | Плід: розмір основних плям                                                                          | дуже малий             | 1   |          |
| 59 | Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)                                 | відсутнє               | 1   |          |
| 60 | Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами                                     | ознака не визначається | 0   |          |
| 61 | Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами                                         | ознака не визначається | 0   |          |
| 62 | Плід: бородавки на шкірці                                                                           | відсутні               | 1   |          |
| 63 | Плід: кількість бородавок на шкірці                                                                 | ознака не визначається | 0   |          |
| 64 | Плід: розмір квіткового рубця                                                                       | малий                  | 3   |          |
| 65 | Плід: плодоніжка за довжиною                                                                        | коротка                | 3   |          |
| 66 | Плід: забарвлення плодоніжки                                                                        | зелене                 | 2   |          |
| 67 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки                                                 | помірна                | 5   |          |
| 68 | Плід: крапчастість плодоніжки                                                                       | наявна                 | 9   |          |
| 69 | Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок) | кремове                | 3   |          |
| 70 | Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)               | помірна                | 5   |          |
| 71 | Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)                                               | кремове                | 2   |          |
| 72 | Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)                                            | відсутній              | 1   |          |
| 73 | Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)                                             | ознака не визначається | 0   |          |
| 74 | Стиглий плід: забарвлення м'якоті                                                                   | жовте                  | 2   |          |
| 75 | Стиглий плід: здерев'яніння шкірки                                                                  | наявне                 | 9   |          |
| 76 | Стиглий плід: структура м'якоті                                                                     | волокниста             | 2   |          |
| 77 | Насінина: розмір                                                                                    | середній               | 5   |          |
| 78 | Насінина: форма                                                                                     | еліптична              | 5   |          |
| 79 | Насінина: лушпиння                                                                                  | наявне                 | 9   |          |
| 80 | Насінина: наявне лушпиння                                                                           | повністю розвинене     | 2   |          |
| 81 | Насінина: забарвлення                                                                               | кремове                | 2   |          |

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 98. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 43. Товарність, % – 89. Вміст сухої речовини, % – 5,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 8; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 7; фузаріозне в'янення (*Fusarium niveum* E.Sm.) – 9; вірусні хвороби – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**