

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.**Заявка № 19096005 Назва сорту:** Алекса **Заявник (код):** 2617 **Власник сорту (код):** 2507**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.11.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210971****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1.1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1.3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2.1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2.3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	прямі	1	
5.1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5.3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцеподібна	5	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8.1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8.2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9.1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	малий	3	
9.2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвильості краю	помірний	5	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	широкообернено-яйцеподібна	5	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до верхівки	1	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	блувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	довга	7	
33.1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стигlosti	пізний	7	
33.2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стигlosti	ознака не визначається	0	
33.3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стигlosti	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягнання	пізний	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 100.Період від сівби до початку досягнання, діб – 140. Лежкість, балів (1–9) – 8. Вміст вітаміну С, мг % – 3,5; загального цукру, % – 5,2; сухої речовини, % – 9,7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7; бактеріоз судинний – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.